

経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症） クリニカルパス

ステップ名称		手術前日		検査当日 手術前		手術当日 PCI手術後		PCI術後1日目 退院日	
		基準日		1日後		2日後			
合併症	客観的観察					穿刺部からの出血がない			
患者状態	バイタル					穿刺部位の血腫がない			
生活動作	活動					循環動態が安定している			
知識・理解	術前	不安の内容を表現できる	不安の内容を表現できる	手術に対する不安を軽減できる					
	術後					転倒リスクを理解でき、安全に歩行できる			
	退院時							退院後の留意点が理解できる	
	検査前日	検査の準備が出来る							
	入院時	入院について理解している							
観察項目	検査前	検査に対する不安を軽減できる	検査に対する不安を軽減できる						
	第0日目								問題なく退院できる
	胸部不快		胸部不快		胸部不快		胸部不快		胸部不快
	冷汗		悪寒（穿刺部）		出血（穿刺部）		出血（穿刺部）		出血（穿刺部）
	不安		不安		悪寒（穿刺部）		悪寒（穿刺部）		悪寒（穿刺部）
緊張		冷汗		冷汗		冷汗		冷汗	
動脈触知（穿刺部）		不安		不安		不安		不安	
動脈触知（左足背動脈）		緊張		緊張		緊張		緊張	
動脈触知（右足背動脈）		悪寒		悪寒		悪寒		悪寒	
		悪寒		悪寒		悪寒		悪寒	
		悪寒		悪寒		悪寒		悪寒	
		悪寒		悪寒		悪寒		悪寒	
検査結果									問題なく退院できる
食事		心臓病食・常食	心臓病食・常食	心臓病食・おにぎり、一口大(大腿動脈穿刺の場合 串刺し食)	心臓病食・おにぎり、一口大(大腿動脈穿刺の場合 串刺し食)	心臓病食・おにぎり、一口大(大腿動脈穿刺の場合 串刺し食)	心臓病食・おにぎり、一口大(大腿動脈穿刺の場合 串刺し食)	心臓病食・常食	
安静度		フリー	フリー	フリー	フリー	フリー	フリー	フリー	
排泄		フリー	大腸動脈アプローチの場合、膀胱留置カテーテル挿入					膀胱留置カテーテルは、回診後抜去	
清潔		入浴・シャワー浴							
検査			CAG		ポータブル心電図			朝食前採血	
					経皮的冠動脈ステント留置術			心電図	
治療処置		ネームバンドの装着（非アプローチ側）	着替え（検査着、アンギオシューズ）	心臓カテーテルプロトコルに準じて圧留解除していく	心臓カテーテルプロトコルに準じて圧留解除していく	心臓カテーテルプロトコルに準じて圧留解除していく	心臓カテーテルプロトコルに準じて圧留解除していく	医師回診時に穿刺部の最終確認	
		剃毛 ・ 横骨動脈：穿刺部周囲のみ ・ 上腕動脈：穿刺部周囲のみ ・ 大腸動脈：脚～両膝まで	入室前に排泄を促す	カ予後、状況に応じて点滴注射（迷走神経反射があったPt・血圧が不安定なPt・腎機能の悪いPtは圧留解除まで点滴継続）	カ予後、状況に応じて点滴注射（迷走神経反射があったPt・血圧が不安定なPt・腎機能の悪いPtは圧留解除まで点滴継続）	カ予後、状況に応じて点滴注射（迷走神経反射があったPt・血圧が不安定なPt・腎機能の悪いPtは圧留解除まで点滴継続）	カ予後、状況に応じて点滴注射（迷走神経反射があったPt・血圧が不安定なPt・腎機能の悪いPtは圧留解除まで点滴継続）	モニター中止	
		穿刺部位の動脈触知確認 ・ 横骨動脈：左右確認 ・ 上腕動脈：左右確認 ・ 大腸動脈：左右確認、両側足背動脈確認（血管の走行に沿ってマーキング）	出庫時 点滴ライン20G針、20G適用輸液セット、三方活栓×2、逆流防止弁、エクステンションチューブ(75cm)×3	モニター装着	モニター装着	モニター装着	モニター装着	モニター装着	
薬剤		ビグアナイド剤の造影剤使用時2日前より中止を確認	テルモ生食1000ml 1袋 投与速度：100ml/h 穿刺部の反対側より 手首周囲は穿刺不可					ビグアナイド剤は退院2日後より再開	
		アセチルコリン負荷試験の予定がある場合 Ca拮抗剤・硝酸薬が2日前より中止されているか確認						退院時服薬指導	
説明・指導		入院オリエンテーション		穿刺部安静について説明				栄養指導（家族同席の有無）	
		術前オリエンテーション						次回再診予定表	
観察		胸部不快	胸部不快		心電図モニター			上腕・大腸動脈穿刺の場合 シャント首確認 安静解除	
		冷汗	冷汗		術室時バイタル測定			胸部不快	
		不安	不安		術室後2h 観察			冷汗	
		緊張	緊張		術室後4h 観察			不安	
		睡眠	睡眠		術室後6h 観察			緊張	
				造影剤アレルギー患者・喘息の患者、確認				睡眠	
			透析患者か、否か確認（点滴）						
			感染性心内膜炎の高リスクの患者、確認						
書類		入院診療計画書	カテーテル検査および血管造影に関する同意書（CAG）	経皮的冠動脈形成術同意書（PCI）				退院療養計画書	
		カテーテル検査および血管造影に関する同意書（CAG）						情報提供書（必要時）	
		経皮的冠動脈形成術同意書（PCI）			ヨード系造影剤を用いた造影検査に関する説明と同意書			GD-Rの有無	
		ヨード系造影剤を用いた造影検査に関する説明と同意書			造影剤問診票			ご報告書の有無	
		造影剤問診票			血管造影記録表				
		入院予約 患者説明書							
手術			CAG s t b PCI						
リハビリ									
カルテ									
転倒・転落									
自己管理									
条件付き指示		発熱時カロナール	造影剤アレルギー患者・喘息の患者、薬剤投与	発熱時カロナール				発熱時カロナール	
		便秘時レシカルボン	透析患者のみ	便秘時レシカルボン				便秘時レシカルボン	
		不眠時レンドルミン	感染性心内膜炎の高リスクの患者	不眠時レンドルミン				不眠時レンドルミン	
		便秘時ケンエーG30洗腸		便秘時ケンエーG30洗腸				便秘時ケンエーG30洗腸	
		便秘時ラクソベロン		便秘時ラクソベロン				便秘時ラクソベロン	
		不寝時セレネース		不寝時セレネース				不寝時セレネース	
		便秘時センナリド		便秘時センナリド				便秘時センナリド	
		発熱時カロナール						発熱時カロナール	
		CKD患者のみ							
		便秘時レシカルボン						便秘時レシカルボン	
		不眠時レンドルミン						不眠時レンドルミン	
		便秘時ケンエーG30洗腸						便秘時ケンエーG30洗腸	
		便秘時ラクソベロン						便秘時ラクソベロン	
	不寝時セレネース						不寝時セレネース		
	便秘時センナリド						便秘時センナリド		