

乳房部分切除術 クリニカルパス											
ステップ名称		入院日		手術当日	手術後 1 日目	手術後 2 日目	手術後 3 日目	手術後 4 日目	手術後 5 日目	手術後 6 日目	
		1 日目	2 日目	3 日目	4 日目	5 日目	6 日目	7 日目	8 日目	9 日目	
合併症	自覚症状										
	客観的観察										
	症状										
重要状態	活動										
	排便・排泄										
	経口										
知識・理解	術前		手術前の絶食量が守れる								
			手術の心構えができている								
			不安の内容を尋ねることができる								
			予定通り手術を受けることができる								
			手術に対する準備ができる								
			手術に対する不安を軽減できる								
	術後			術部感染を起こさない	術部感染を起こさない	術部感染を起こさない				乳房切除後のリンパの必要性について理解ができる	
					退院が可能な状態であることを、本人・家族が理解している	退院が可能な状態であることを、本人・家族が理解している	退院後の留意点が理解できる	退院後の留意点が理解できる			
							退院に対して不安がない	退院に対して不安がない			
		入院時	入院環境に慣れ、手術の受け入れができる								
			本人及び家族が治療計画を理解している								
			本人及び家族が手術・麻酔について理解している								
退院後	手術の必要性・危険性について理解している										
	乳房切除の必要性を理解している										
観察項目	第1病日	浸出液	浸出液	浸出液	浸出液	浸出液	浸出液	浸出液	浸出液	浸出液	
		疼痛	疼痛	疼痛	疼痛	疼痛	疼痛	疼痛	疼痛	疼痛	
		不安	不安	不安	不安	不安	不安	不安	不安	不安	
		観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	
		出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）	
		経口	経口	経口	経口	経口	経口	経口	経口	経口	
	第2病日	浸出液	浸出液	浸出液	浸出液	浸出液	浸出液	浸出液	浸出液	浸出液	
		疼痛	疼痛	疼痛	疼痛	疼痛	疼痛	疼痛	疼痛	疼痛	
		不安	不安	不安	不安	不安	不安	不安	不安	不安	
		観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	
		出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）	
		経口	経口	経口	経口	経口	経口	経口	経口	経口	
検査結果	第1病日	普通食	2 1 時より絶食	絶食	絶食	絶食	絶食	絶食	絶食	絶食	
		手術室入室の 3 時間前から絶食									
		ベッド上安静									
		安静度									
		排便									
		清潔									
	第2病日	手術室にて術室（ポータル撮影）									
		観察のたび創部圧迫が避けられ、出血の有無観察									
		必要物品の確認									
		安静度									
		排便									
		清潔									
薬剤	第1病日	持参薬の確認（術前入院薬も含め）	必要持参薬は薬のみ服用（6～7 時頃）	必要持参薬開始							
		観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	
		安静度									
		排便									
		清潔									
		検査									
	第2病日	手術室にて術室（ポータル撮影）									
		観察のたび創部圧迫が避けられ、出血の有無観察									
		必要物品の確認									
		安静度									
		排便									
		清潔									
観察	第1病日	手術室にて術室（ポータル撮影）									
		観察のたび創部圧迫が避けられ、出血の有無観察									
		必要物品の確認									
		安静度									
		排便									
		清潔									
	第2病日	手術室にて術室（ポータル撮影）									
		観察のたび創部圧迫が避けられ、出血の有無観察									
		必要物品の確認									
		安静度									
		排便									
		清潔									
検査結果	第1病日	普通食	2 1 時より絶食	絶食	絶食	絶食	絶食	絶食	絶食	絶食	
		手術室入室の 3 時間前から絶食									
		ベッド上安静									
		安静度									
		排便									
		清潔									
	第2病日	手術室にて術室（ポータル撮影）									
		観察のたび創部圧迫が避けられ、出血の有無観察									
		必要物品の確認									
		安静度									
		排便									
		清潔									
薬剤	第1病日	持参薬の確認（術前入院薬も含め）	必要持参薬は薬のみ服用（6～7 時頃）	必要持参薬開始							
		観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	
		安静度									
		排便									
		清潔									
		検査									
	第2病日	手術室にて術室（ポータル撮影）									
		観察のたび創部圧迫が避けられ、出血の有無観察									
		必要物品の確認									
		安静度									
		排便									
		清潔									
観察	第1病日	手術室にて術室（ポータル撮影）									
		観察のたび創部圧迫が避けられ、出血の有無観察									
		必要物品の確認									
		安静度									
		排便									
		清潔									
	第2病日	手術室にて術室（ポータル撮影）									
		観察のたび創部圧迫が避けられ、出血の有無観察									
		必要物品の確認									
		安静度									
		排便									
		清潔									
検査結果	第1病日	普通食	2 1 時より絶食	絶食	絶食	絶食	絶食	絶食	絶食	絶食	
		手術室入室の 3 時間前から絶食									
		ベッド上安静									
		安静度									
		排便									
		清潔									
	第2病日	手術室にて術室（ポータル撮影）									
		観察のたび創部圧迫が避けられ、出血の有無観察									
		必要物品の確認									
		安静度									
		排便									
		清潔									
薬剤	第1病日	持参薬の確認（術前入院薬も含め）	必要持参薬は薬のみ服用（6～7 時頃）	必要持参薬開始							
		観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	
		安静度									
		排便									
		清潔									
		検査									
	第2病日	手術室にて術室（ポータル撮影）									
		観察のたび創部圧迫が避けられ、出血の有無観察									
		必要物品の確認									
		安静度									
		排便									
		清潔									
観察	第1病日	手術室にて術室（ポータル撮影）									
		観察のたび創部圧迫が避けられ、出血の有無観察									
		必要物品の確認									
		安静度									
		排便									
		清潔									
	第2病日	手術室にて術室（ポータル撮影）									
		観察のたび創部圧迫が避けられ、出血の有無観察									
		必要物品の確認									
		安静度									
		排便									
		清潔									
検査結果	第1病日	普通食	2 1 時より絶食	絶食	絶食	絶食	絶食	絶食	絶食	絶食	
		手術室入室の 3 時間前から絶食									
		ベッド上安静									
		安静度									
		排便									
		清潔									
	第2病日	手術室にて術室（ポータル撮影）									
		観察のたび創部圧迫が避けられ、出血の有無観察									
		必要物品の確認									
		安静度									
		排便									
		清潔									
薬剤	第1病日	持参薬の確認（術前入院薬も含め）	必要持参薬は薬のみ服用（6～7 時頃）	必要持参薬開始							
		観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	
		安静度									
		排便									
		清潔									
		検査									
	第2病日	手術室にて術室（ポータル撮影）									
		観察のたび創部圧迫が避けられ、出血の有無観察									
		必要物品の確認									
		安静度									
		排便									
		清潔									
観察	第1病日	手術室にて術室（ポータル撮影）									
		観察のたび創部圧迫が避けられ、出血の有無観察									
		必要物品の確認									
		安静度									
		排便									
		清潔									
	第2病日	手術室にて術室（ポータル撮影）									
		観察のたび創部圧迫が避けられ、出血の有無観察									
		必要物品の確認									
		安静度									
		排便									
		清潔									
検査結果	第1病日	普通食	2 1 時より絶食	絶食	絶食	絶食	絶食	絶食	絶食	絶食	
		手術室入室の 3 時間前から絶食									
		ベッド上安静									
		安静度									
		排便									
		清潔									
	第2病日	手術室にて術室（ポータル撮影）									
		観察のたび創部圧迫が避けられ、出血の有無観察									
		必要物品の確認									
		安静度									
		排便									
		清潔									
薬剤	第1病日	持参薬の確認（術前入院薬も含め）	必要持参薬は薬のみ服用（6～7 時頃）	必要持参薬開始							
		観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	観察	
		安静度									
		排便									
		清潔									
		検査									
	第2病日	手術室にて術室（ポータル撮影）									
		観察のたび創部圧迫が避けられ、出血の有無観察									
		必要物品の確認									
		安静度									
		排便									
		清潔									
観察	第1病日	手術室にて術室（ポータル撮影）									
		観察のたび創部圧迫が避けられ、出血の有無観察									
		必要物品の確認									
		安静度									
		排便									
		清潔									
	第2病日	手術室にて術室（ポータル撮影）									
		観察のたび創部圧迫が避けられ、出血の有無観察									
		必要物品の確認									
		安静度									
		排便									
		清潔									
検査結果	第1病日	普通食	2 1 時より絶食	絶食	絶食	絶食	絶食	絶食	絶食	絶食	
		手術室入室の 3 時間前から絶食									
		ベッド上安静									
		安静度									
		排便									
		清潔									
	第2病日	手術室にて術室（ポータル撮影）									
		観察のたび創部圧迫が避けられ、出血の有無観察									
		必要物品の確認									
		安静度									
		排便									
		清潔									