

膀胱腫瘍切除術 クリニカルパス

ステップ名称		入院当日	手術当日 午前中	手術当日 手術後	第3病日	第4病日	第5病日	第6病日	第7病日	第8病日
		1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	
合併症	自覚症状			苦痛・創部痛のコントロールができ 血尿の増強がない 血尿がない	苦痛・創部痛のコントロールができ 血尿の増強がない 血尿がない	苦痛・創部痛のコントロールができ 血尿の増強がない 血尿がない	苦痛・創部痛のコントロールができ 血尿の増強がない 血尿がない			
	活動			ADLの拡大に努める	ADLの拡大に努める	ADLの拡大に努める				
生活動作	排便・排尿			膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している	膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している	膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している	膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している	膀胱留置カテーテル抜去後排尿障害を起こさない	膀胱留置カテーテル抜去後排尿障害を起こさない	膀胱留置カテーテル抜去後排尿障害を起こさない
	術前		術前準備が整っている 不安の内容を表出できる 手術に対する準備ができる							
知識・理解	術後						尿路感染を起こさない			
	入院時	入院環境に慣れ、手術の受け入れができる								
	検査中		手術がスムーズに行われる							
	検査後			異常の早期発見と対処ができる	異常の早期発見と対処ができる	異常の早期発見と対処ができる	異常の早期発見と対処ができる			
観察項目	残尿感		排尿障害	残尿感	疼痛（下腹部）	疼痛（下腹部）	疼痛（下腹部）	疼痛（下腹部）	疼痛（下腹部）	疼痛（下腹部）
	排尿障害		残尿感	残尿感	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）
	血尿（血尿スケール）		血尿（血尿スケール）	尿量	尿量	尿量	尿量	尿量	尿量	尿量
	尿量		尿量（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）						
検査結果										
食事		21時～絶飲食	朝から絶飲食	朝から絶飲食	朝から食事開始 希望食または治療食	希望食	希望食	希望食	希望食	希望食
安静度		フリー	病室内フリー	ベット上安静	回診後歩行可	病棟フリー	フリー	フリー	フリー	フリー
排泄				Ba血尿の有無確認（管内スケール3以上 Dr. コールお願いします）	Ba血尿の有無確認（管内スケール3以上 Dr. コールお願いします）	Ba血尿の有無確認（管内スケール3以上 Dr. コールお願いします）	Ba血尿の有無確認（管内スケール3以上 Dr. コールお願いします）			
清潔	入浴 爪切り				回診後、シャワー可	シャワー	シャワー	シャワー	シャワー	シャワー
	更衣 環境整備		更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備
検査					血算、生化学					
治療処置			弾性ストッキング着用	酸素3Lマスク	弾性ストッキングoff		回診時膀胱留置カテーテル抜去 畜尿有無Driに確認。必	回診時膀胱留置カテーテル抜去 畜尿有無Driに確認。必要時畜尿準備	バルーン抜去2日経過し問題なければ退院可能	バルーン抜去2日経過し問題なければ退院可能
				モニター						
				フロートロン						
				自動監視血圧計						
薬剤		21時センナリド2T 必要時リスミール錠	必要時常用薬服用 6時術前点滴開始 ①ソルアセットF500ml ②ソルアセットF500ml	持続点滴 ①ソルアセットD500ml （80ml/h） ②アセトキープ3G500ml （80ml/h） ③ソルアセットD500ml	持続点滴 ①ソルアセットD500ml （80ml/h） セファゾリンNa1g 1キット					
		常用薬継続	手術室持参生食2ポート 100ml＋セファゾリンNa1g 1キット							
説明・指導		麻酔科医より説明			Ba留置中の注意点			退院指導		退院時説明
		入院時オリエンテーション								退院証明書
		入院治療計画書								退院時服薬指導
		麻酔、手術内容説明								再来予約票
		手術依頼確認								10時退院
		手術必要物品説明								
		承諾書回収								
		畜尿方法の説明								
観察	排尿障害		排尿障害	下腹部痛 Ba挿入部違和感 血尿の有無 外尿道口部の出血 Baの閉塞の有無 呼吸器合併症の有無 尿量 睡眠	下腹部痛 Ba挿入部違和感 血尿の有無 外尿道口部の出血 Baの閉塞の有無 呼吸器合併症の有無 尿量 睡眠	下腹部痛 Ba挿入部違和感 血尿の有無 外尿道口部の出血 Baの閉塞の有無 呼吸器合併症の有無 尿量 睡眠	下腹部痛 Ba挿入部違和感 血尿の有無 外尿道口部の出血 Baの閉塞の有無 呼吸器合併症の有無 尿量 睡眠	下腹部痛 Ba挿入部違和感 血尿の有無 外尿道口部の出血 Baの閉塞の有無 呼吸器合併症の有無 尿量 睡眠	下腹部痛 Ba挿入部違和感 血尿の有無 外尿道口部の出血 Baの閉塞の有無 呼吸器合併症の有無 尿量 睡眠	下腹部痛 Ba挿入部違和感 血尿の有無 外尿道口部の出血 Baの閉塞の有無 呼吸器合併症の有無 尿量 睡眠
	残尿感									
	書類									
	手術		オペ後ベッドに酸素マスク フラットベッドを確保する							
リハビリ										
カルテ										
転倒・転落										
自己管理										
条件付き指示		不眠時		疼痛時 ①アデフロニック座薬50mg ②生食100ml＋ソセゴン	疼痛時 ①アデフロニック座薬50mg ②生食100ml＋ソセゴン	疼痛時 ①アデフロニック座薬50mg ②カロナール（200）4T	疼痛時 ①アデフロニック座薬50mg ②カロナール（200）4T 6時間 あけて再度服用可	疼痛時 ①アデフロニック座薬50mg ②カロナール（200）4T 6時間 あけて再度服用可	疼痛時 ①アデフロニック座薬50mg ②カロナール（200）4T 6時間 あけて再度服用可	疼痛時 ①アデフロニック座薬50mg ②カロナール（200）4T 6時間 あけて再度服用可