

経尿道的尿管結石破砕術 クリニカルパス

ステップ名称		手術前日	手術当日 午前中	手術当日 手術後	第1病日	第2病日	第3病日 退院
		1日目	2日目		3日目	4日目	5日目
合併症	自覚症状			苦痛・創部痛のコントロールができる	苦痛・創部痛のコントロールができる	苦痛・創部痛のコントロールができる	
生活動作	活動 排便・排尿			ADLの拡大に努める 膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している	ADLの拡大に努める 膀胱留置カテーテル除去後排尿障害を起さない	ADLの拡大に努める 膀胱留置カテーテル除去後排尿障害を起さない	膀胱留置カテーテル除去後排尿障害を起さない
知識・理解	退院時						退院が可能な状態であることを、本人・家族が理解している
	入院時	入院環境に慣れ、手術の受け入れができる					退院後の留意点が理解できる
	検査中		手術がスムーズに行われる				
	検査後 第n病日			異常の早期発見と対処ができる	異常の早期発見と対処ができる	異常の早期発見と対処ができる	問題なく退院できる
観察項目	残尿感						
	排尿障害 残尿感 血尿（血尿スケール） 尿量						
検査結果	残尿感						
	排尿障害 残尿感 血尿（血尿スケール） 尿量						
食事		希望食または治療食 21時～絶飲食	朝食から絶飲食	朝から絶飲食	朝から食事 希望食または治療食	希望食	希望食
安静度		フリー	病棟内フリー	ベット上安静	フリー	フリー	フリー
排泄							
清潔	入浴 爪切り		更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備
	更衣 環境整備		更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備 シャワー可	更衣 環境整備 シャワー可	更衣 環境整備 シャワー
検査		KUB（8:00）	手術中透視	血算、生化学 KUB			
治療処置			酸素3Lマスク モニター 自動監視血圧計	回診時、バルーン抜去 弾性ストッキングoff 膀胱留置カテーテル抜去後、尿こし蓄尿で排石確認			
薬剤	常用薬継続		必要時常用薬服用 9時前点滴開始 ①ソルアセットF500ml ②ソルアセットF500ml	持続点滴 ①ソルアセットD500ml (80ml/h) ②アセットキープ3 G500ml (80ml)	持続点滴 ①ソルアセットD500ml (80ml/h) 午前中：セフメタゾールa1g 1キット 昼～常用薬服用		
	21時センナリド2T 必要時リスミー錠		手術室持参セフメタゾール 1キット				
説明・指導	入院時オリエンテーション		手術必要物品確認 ・巻帯 ・T字帯 ・バスタオル ・ティッシュ 麻酔承諾書回収確認		Ba留置中の注意点	服薬指導	退院時説明
	入院治療計画書						退院証明書
	麻酔、手術内容説明						退院時服薬指導
	手術伝票確認						再来予約票
	手術必要物品説明						10時退院
	承諾書回収						
	畜尿方法の説明						
麻酔科医師より説明（外来で説明がなかった時）							
観察	排尿障害 残尿感 血尿 尿量 睡眠		排尿障害 残尿感 血尿 尿量 睡眠		疼痛 Ba挿入部違和感 血尿の有無 外尿道口部の出血 Baの閉塞の有無 睡眠	疼痛 血尿の有無 睡眠	疼痛 血尿の有無
糖尿病							
書類	同意書						
手術							
リハビリ							
カルテ							
転倒・転落							
自己管理							
条件付き指示		不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時
				疼痛時 ①アデフロニック産薬50mg ②生食100ml＋ソセゴン15＋アタラックスP25	疼痛時 ①アデフロニック産薬50mg ②生食100ml＋ソセゴン15＋アタラックスP25	疼痛時 ①アデフロニック産薬50mg ②カロナル（200）4T 6時間あけて再度服用可	疼痛時 ①アデフロニック産薬50mg ②カロナル（200）4T 6時間あけて再度服用可