















## 乳房悪性腫瘍 化学療法

ステップ名称		入院日 化学療法当日	入院2日目
		1日目	2日目
患者状態	症状	悪心・嘔吐がない	
知識・理解	外来にて	治療に対する受け入れが出来る	
	退院時	退院後の留意点が理解できる	退院後の留意点が理解できる
			退院に対して不安がない
			日常生活の留意点が実行できる
	入院時	本人及び家族が治療計画を理解している	
第n病日		問題なく退院できる	
観察項目		嘔気	嘔気
		嘔吐	嘔吐
		食欲	食欲
		不安	不安
		腫脹	
検査結果			
食事		 普通食	 普通食
安静度		 病棟内フリー	 病棟内フリー
排泄			
清潔		 化学療法終了後、シャワー・入浴可	
検査			
治療処置			
薬剤		 薬剤師から服薬指導	
説明・指導		 西口CNからの退院指導	
観察			
糖尿病			
書類			
手術			
リハビリ			
カルテ			
転倒・転落		 嘔気・嘔吐 食欲 点滴漏れの有無 化学療法投与時、有害事象の有無	 嘔気・嘔吐 食欲 点滴漏れの有無 化学療法投与時、有害事象の有無
			 嘔気・嘔吐 食欲 点滴漏れの有無 化学療法投与時、有害事象の有無
		 入院診療計画書作成	 化学療法後の療養生活について
		 化学療法承諾書	
		 化学療法中、心電図モニター装着終了後OFF	

自己管理		 バイタルサイン 化学療法投与時 5分 15分 (テンプレート使用) 化学療法終了後 3検	
		 外来にてライン確保 (20~22G)	
		 化学療法を受ける患者さまへのパンフレットを使用し説明 (外来で説明をうけているのか確認)	
		 入院時オリエンテーション (外来化学療法室からのオリエンテーション)	
条件付き指示		 血圧 160/mmHg 以上 アムロジピン 5mg1錠 85/mmHg 以下 Dr call	 血圧 160/mmHg 以上 アムロジピン 5mg1錠 85/mmHg 以下 Dr call
		 疼痛時 ①カロナール200mg2錠 ②アセリオ静注液1000mg100mL1袋③アデフロニックズポ50 50mg 1個 6時間空けて (喘息・潰瘍ある時は使用禁)	 疼痛時 ①カロナール200mg2錠 ②アセリオ静注液1000mg100mL1袋③アデフロニックズポ50 50mg 1個 6時間空けて (喘息・潰瘍ある時は使用禁)
		 発熱時 (38度以上) ①カロナール200mg 2錠 ②アデフロニックズポ50 50mg 1個	 発熱時 (38度以上) ①カロナール200mg 2錠 ②アデフロニックズポ50 50mg 1個
		 不眠時 ①ルネスタ錠1mg 1錠 ②リスミー錠2mg 1錠	 不眠時 ①ルネスタ錠1mg 1錠 ②リスミー錠2mg 1錠
		 不穏時 ①セレネース錠 0.75mg1錠②リスペリドン内 液1mg/mL 1包	 不穏時 ①セレネース錠 0.75mg1錠②リスペリドン内 液1mg