

腹腔鏡下虫垂切除術 クリニカルパス

ステップ名称		入院日 術前	入院日 術後	術後1日目	術後2日目	術後3日目 退院
		1日目		2日目	3日目	4日目
合併症	自覚症状		苦痛・創部痛のコントロールができる	苦痛・創部痛のコントロールができる	苦痛・創部痛のコントロールができる	
	客観的観察		創部の出血がない 創部の発赤・腫脹がない	創部の出血がない	創部の出血がない	
患者状態	症状		悪心・嘔吐がない 創痛コントロールができています	創痛コントロールができています	疼痛コントロールができています	
生活動作	活動			早期離床ができる		
知識・理解	術前	手術の心構えができています				
		予定通り手術を受けることができます 手術に対する不安を軽減できます				
	術後		疼痛・苦痛、気分不良を訴えることができます	疼痛・苦痛、気分不良を訴えることができます	疼痛・苦痛、気分不良を訴えることができます	
			創部感染を起こさない	創部感染を起こさない	創部感染を起こさない	
退院時					退院が可能な状態であることを、本人・家族が理解している 退院に対して不安がない	
観察項目		胃部不快	嘔気	嘔気	嘔気	嘔気
		嘔吐	嘔吐	嘔吐	嘔吐	嘔吐
		出血(創部)	出血(創部)	胃部不快	食欲	浸出液
		睡眠	浸出液	出血(創部)	浸出液	睡眠
		疼痛	浸出液(ガーゼ)	浸出液	睡眠	疼痛(創部)
		排ガス	睡眠	自尿	腸蠕動音	排ガス
		膨満感(腹部)	疼痛(創部)	睡眠	疼痛(創部)	膨満感(腹部)
			排ガス	腸蠕動音	排ガス	
			膨満感(腹部)	疼痛(創部)		
				排ガス		
		膨満感(腹部)				
検査結果						
検査	血液検査			採血		採血
	放射線			レントゲン		レントゲン
	生理検査					
	血管造影					
処方			内服	内服	内服	
処置	看護		4時間尿チェック	創部観察	創部観察	
	透析					
注射	術前点滴	点滴	点滴	点滴		
食事	絶食	絶食	回診後昼から5分粥食事開始	昼から全粥		
安静度	安静度フリー	ベッド上安静	回診後モニターOFF・Ba抜去・安静度フリー	安静度フリー		
清潔				清拭		
指導	医師					
	看護				離床について	退院
	栄養指導					
	服薬指導			服薬指導		
看護問題						
観察項目						
確認項目			持参薬再開確認			
リハビリ			離床	離床		
退院調整					退院調整	
カルテ						
条件付き指示		輸液負荷	輸液負荷	輸液負荷	輸液負荷	輸液負荷
		血圧180以上	血圧180以上	血圧180以上	血圧180以上	血圧180以上
		不穏時	不穏時	不穏時	不穏時	不穏時
		不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時
		便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時
		疼痛時	疼痛時	疼痛時	疼痛時	疼痛時
		嘔気嘔吐時	嘔気嘔吐時	嘔気嘔吐時	嘔気嘔吐時	嘔気嘔吐時
		低血糖	低血糖	低血糖	低血糖	低血糖
発熱時 腎機能悪化	発熱時 腎機能悪化	発熱時 腎機能悪化	発熱時 腎機能悪化	発熱時 腎機能悪化		
発熱時	発熱時	発熱時	発熱時	発熱時		