

経尿道的尿路結石除去術（レーザー） クリニカルパス

ステップ名称		手術前日	手術前日	手術当日 午前中	手術当日 手術後	第1病日	第2病日	第3病日 退院	第4病日 予備日
		1日目	2日目	3日目		4日目	5日目	6日目	7日目
合併症	自覚症状				苦痛・創部痛のコントロールができる	苦痛・創部痛のコントロールができる	苦痛・創部痛のコントロールができる	苦痛・創部痛のコントロールができる	
	活動				ADLの拡大に努める	ADLの拡大に努める	ADLの拡大に努める	ADLの拡大に努める	
生活動作	排便・排尿				膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している	膀胱留置カテーテル抜去後排尿障害を起こさない	膀胱留置カテーテル抜去後排尿障害を起こさない	膀胱留置カテーテル抜去後排尿障害を起こさない	膀胱留置カテーテル抜去後排尿障害を起こさない
知識・理解	退院時							退院が可能な状態であることを、本人・家族が理解している	
	入院時	入院環境に慣れ、手術の受け入れができる	入院環境に慣れ、手術の受け入れができる					退院後の留意点が理解できる	
	検査中			手術がスムーズに行われる				退院に対して不安がない	
	検査後				異常の早期発見と対処ができる	異常の早期発見と対処ができる	異常の早期発見と対処ができる	異常の早期発見と対処ができる	
観察項目	第1病日							問題なく退院できる	
	残尿感 排尿障害 血尿（血尿スケール） 尿量	残尿感 排尿障害 血尿（血尿スケール） 尿量	残尿感 排尿障害 血尿（血尿スケール） 尿量	排尿障害 残尿感 血尿（血尿スケール） 尿量		疼痛（下腹部） 血尿（血尿スケール） 尿量	疼痛（下腹部） 血尿（血尿スケール） 尿量	疼痛（下腹部） 血尿（血尿スケール） 尿量	疼痛（下腹部） 血尿（血尿スケール） 尿量
検査結果									
食事	希望食または治療食	希望食または治療食	希望食または治療食	朝食から絶飲食	朝食から絶飲食	朝食から食事 希望食または治療食	希望食	希望食	希望食
	21時～絶飲食	21時～絶飲食	21時～絶飲食						
安静度	フリー	フリー	病棟内フリー	ベット上安静	フリー	フリー	フリー	フリー	
排泄									
清潔	入浴 爪切り	入浴 爪切り							
	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備
検査			KUB（8：00）	手術中透視	血算、生化学	KUB			
治療処置				酸素3Lマスク	回診時、バルーン抜去				
				モニター	弾性ストッキングoff				
薬剤	常用薬継続	常用薬継続	必要時常用薬服用 6時前点滴開始 ①ソルアセットF500ml ②ソルアセットF500ml	持続点滴 ①ソルアセットD500ml（80ml/h） ②アセットキープ3 G500ml（80ml/h） ③ソルアセットD500ml（80ml/h）	持続点滴 ①ソルアセットD500ml（80ml/h） 午前中：セフメタゾールa1g 1キット				
	21時センナリド2T 必要時リスミー1錠	21時センナリド2T 必要時リスミー1錠	手術室持参セフメタゾール 1キット		昼～常用薬服用				
説明・指導	入院時オリエンテーション	入院時オリエンテーション	手術必要物品確認 ・寝巻 ・Tシャツ ・バスタオル ・ティッシュ 麻酔承諾書回収確認		Be留置中の注意点			退院時説明	退院時説明
	入院治療計画書	入院治療計画書						退院証明書	退院証明書
	麻酔、手術内容説明	麻酔、手術内容説明						退院時服薬指導	退院時服薬指導
	手術伝票確認	手術伝票確認						再来予約票	再来予約票
	手術必要物品説明	手術必要物品説明						10時退院	10時退院
	承諾書回収	承諾書回収							
	畜尿方法の説明	畜尿方法の説明							
麻酔科医より説明（外来で説明がなかった時）	麻酔科医より説明（外来で説明がなかった時）								
観察	排尿障害 残尿感 血尿 尿量 睡眠	排尿障害 残尿感 血尿 尿量 睡眠	排尿障害 残尿感 血尿 尿量 睡眠	疼痛 Be挿入部違和感 血尿の有無 外尿道口部の出血 Beの閉塞の有無 睡眠	疼痛 血尿の有無 睡眠	疼痛 血尿の有無	疼痛 血尿の有無	疼痛 血尿の有無	
糖尿病									
書類									
手術									
リハビリ									
カルテ									
転倒・転落									
自己管理									
条件付き指示	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時
		不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時
				疼痛時 ①アデフロニック座薬50mg ②生食100ml＋ソセゴン15＋アタラックスP25	疼痛時 ①アデフロニック座薬50mg ②生食100ml＋ソセゴン15＋アタラックスP25	疼痛時 ①アデフロニック座薬50mg ②カロチール（200）4T 6時間 あけて再度服用可	疼痛時 ①アデフロニック座薬50mg ②カロチール（200）4T 6時間 あけて再度服用可	疼痛時 ①アデフロニック座薬50mg ②カロチール（200）4T 6時間 あけて再度服用可	