

乳房悪性腫瘍 化学療法

| ステップ名称 | | 入院日 化学療法当日 | 入院2日目 |
|--------|------|---|---|
| | | 1日目 | 2日目 |
| 患者状態 | 症状 | 悪心・嘔吐がない | |
| 知識・理解 | 外来にて | 治療に対する受け入れができる | |
| | 退院時 | 退院後の留意点が理解できる | 退院後の留意点が理解できる |
| | | | 退院に対して不安がない |
| | 入院時 | 本人及び家族が治療計画を理解している | 日常生活の留意点が行える |
| | 第n病日 | | 問題なく退院できる |
| 観察項目 | | 嘔気 | 嘔気 |
| | | 嘔吐 | 嘔吐 |
| | | 食欲 | 食欲 |
| | | 不安 | 不安 |
| | | 腫脹 | |
| 検査結果 | | | |
| 食事 | |  普通食 |  普通食 |
| 安静度 | |  病棟内フリー |  病棟内フリー |
| 排泄 | | | |
| 清潔 | |  化学療法終了後、シャワー・入浴可 | |
| 検査 | | | |
| 治療処置 | | | |
| 薬剤 | |  薬剤師から服薬指導 | |
| 説明・指導 | |  西口CNからの退院指導 | |
| 観察 | | | |
| 糖尿病 | | | |
| 書類 | | | |
| 手術 | | | |
| リハビリ | | | |
| カルテ | | | |
| 転倒・転落 | |  嘔気・嘔吐 食欲 点滴漏れの有無 化学療法投与時、有害事象の有無 | ➡  嘔気・嘔吐 食欲 点滴漏れの有無 化学療法投与時、有害事象の有無 |
| | | |  嘔気・嘔吐 食欲 点滴漏れの有無 化学療法投与時、有害事象の有無 |
| | |  入院診療計画書作成 |  化学療法後の療養生活について |
| | |  化学療法承諾書 | |
| | |  化学療法中、心電図モニター装着終了後OFF | |

| | | | |
|--------|--|---|---|
| 自己管理 | |  バイタルサイン 化学療法投与時 5分 15分 (テンプレート使用) 化学療法終了後 3検 | |
| | |  外来にてライン確保 (20~22G) | |
| | |  化学療法を受ける患者さまへのパンフレットを使用し説明 (外来で説明をうけているのか確認) | |
| | |  入院時オリエンテーション (外来化学療法室からのオリエンテーション) | |
| 条件付き指示 | |  血圧 160/mmHg 以上 アムロジピン 5mg1錠 85/mmHg 以下 Dr call |  血圧 160/mmHg 以上 アムロジピン 5mg1錠 85/mmHg 以下 Dr call |
| | |  疼痛時 ①カロナール200mg2錠②アセリオ静注液 1000mg100mL1袋③アデフロニックズポ50 50mg 1個 6時間空けて (喘息・潰瘍ある時は使用禁) |  疼痛時 ①カロナール200mg2錠②アセリオ静注液 1000mg100mL1袋③アデフロニックズポ50 50mg 1個 6時間空けて (喘息・潰瘍ある時は使用禁) |
| | |  発熱時 (38度以上) ①カロナール200mg 2錠 ②アデフロニックズポ50 50mg 1個 |  発熱時 (38度以上) ①カロナール200mg 2錠 ②アデフロニックズポ50 50mg 1個 |
| | |  不眠時 ①ルネスタ錠1mg 1錠 ②リスミー錠2mg 1錠 |  不眠時 ①ルネスタ錠1mg 1錠 ②リスミー錠2mg 1錠 |
| | |  不穏時 ①セレネース錠 0.75mg1錠②リスペリドン内用液1mg/mL 1包 |  不穏時 ①セレネース錠 0.75mg1錠②リスペリドン内用液1mg/mL 1包 |