

前立腺生検 クリニカルパス

ステップ名称		手術前	入院1日 手術後	術後1日目 退院日
		1日目		2日目
合併症	自覚症状		血尿の増強がない	
			血尿がない	
知識・理解	術前	手術前の絶飲食が守れる		
		術前準備が整っている		
		手術の心構えができています		
		予定通り手術を受けることができます		
	術後		異常の早期発見と対処ができる	異常の早期発見と対処ができる
				退院が可能な状態であることを、本人・家族が理解している
退院時			退院後の留意点が理解できる	
			退院に対して不安がない	
入院時		入院環境に慣れ、検査の受け入れができる		
		本人及び家族が治療計画を理解している		
		本人及び家族が手術・麻酔について理解している		
第n病日			問題なく退院できる	
観察項目		血尿（血尿スケール）	自尿	自尿
		残尿感	排尿障害	排尿障害
		排尿障害	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）
		便意	残尿感	残尿感
		不安	疼痛	疼痛
		尿量	尿量	尿量
検査結果				
食事		 当日の朝食事可  AM10時まで飲水のみ可 禁飲食	 帰宅後、飲水可 夕食より食事開始	 常食または治療食
安静度		 病棟内フリー	 術後2時間ベット上安静 トイレ時歩行可 その後フリー	 フリー
排泄		 OPE入室前に排尿	 術後2時間以内でもトイレ歩行可 ・蓄尿開始（翌日回診まで） ・排便確認（血便多量時はDrCall） ・腹満あれば導尿またはBa挿入	 フリー
清潔				 シャワー可
検査		 外来検査結果確認	 検体提出確認	
治療処置		 オペ後ベッドにはフラットオムツ1枚+酸素マスクを乗せます。		
薬剤		 10時より13時術前点滴開始 ソルアセトF500ml 80ml/h	 手術後点滴、終了後抜針 ①ソルアセトD500ml ②ソリタT3 500ml 生食100ml+セフトリアキソンナトリウム1g（帰宅8時間後）	 朝より抗生剤内服開始（退院処方） セフカベンピボキシル塩酸塩3T分3×2日分（飲みきり終了） 常用薬服用（抗凝固薬以外すべて再開） 抗凝固薬は回診時確認
		 セフトリアキソンナトリウム1g + 生食100ml（手術室持参）	 オペ後抗生剤はオペ室使用後8時間で使用OK	
		 常用薬剤確認。 オペ当日朝・オペ当日夕食時からの内服確認も一緒をお願いします		
説明・指導		 外来で手術オリエンテーション	 排便時無理な怒責をかけない	 排便時無理な怒責をかけない
		 入院計画書		 退院証明書
		 手術伝票確認		 服薬指導
		 手術後安静の必要性を指導		 10時退院
		 手術承諾書・麻酔同意書回収確認		 血尿、下血、発熱などの症状があったら病院に相談してください。
		 手術後の必要物品の確認		
		 入院時オリエンテーション		
観察		 排尿障害 血尿 残尿感 排便 術前の不安 睡眠中	 自尿 排尿障害 血尿 残尿感 疼痛 睡眠中	 自尿 排尿障害 血尿 残尿感 疼痛 睡眠中
糖尿病				
書類		 <ul style="list-style-type: none"> 入院診療計画書 承諾書 麻酔同意書・説明書 生検説明書 		
手術				
リハビリ				
カルテ				
転倒・転落				
自己管理				
条件付き指示		 検査1時間前までに排便ない場合	 発熱疼痛時 ①カロナール200 2錠 疼痛時 ①生食100ml+ソセゴン15mg+アラックスP25mg	 発熱疼痛時 ①カロナール200 2錠 疼痛時 ①生食100ml+ソセゴン15mg+アラックスP25mg
			尿閉時 導尿またはバルーン挿入（入りにくければDr依頼）	