

ステップ名称		入院	術当日	術当日
		1日前	基準日	
			術前	術後
合併症	自覚症状			苦痛・創部痛のコントロールができる
	客観的観察		深部静脈血栓症がない	創部の出血がない 創部の発赤・腫脹がない 術後神経障害がない
患者状態	症状		疼痛コントロールができています	
生活動作	活動		下肢挙上・ベッド上安静が守れる	
知識・理解	術前		手術前の絶食が守れる	
	検査前日		手術に対する不安を軽減できる	
	入院時	手術の準備ができる		
観察項目		睡眠	睡眠	睡眠
		疼痛	疼痛	疼痛
		腫脹	神経麻痺（腓骨神経）	腫脹
		しびれ	可動性（足趾）	しびれ
		熱感	腫脹	熱感
			しびれ	出血（創部）
			熱感	心電図モニター波形
			動脈触知（左足背動脈）	呼吸困難感
			動脈触知（右足背動脈）	
検査結果				
合併症				
アウトカム評価				創部観察
観察項目		患部観察	患部観察	患部観察
食事		常食（21時以降絶食）	7時以降絶食	術後3時間後より飲水可、術後6時間後より食事可
排泄		痛みに応じてトイレ可	痛みに応じてトイレ可	術後最低3時間は床上排泄、それ以降は疼痛に応じてトイレ可
清潔		シャワー浴	清拭後、手術着に更衣	
			清拭	清拭
安静度		痛みに応じてフリ		術後3時間より、疼痛に応じてフリ
検査		D9'イマ-2以上で下肢エコー		
治療処置		パイリフィン測定 ネームバンド装着 点滴ルート確保	パイリフィン測定	パイリフィン測定 心電図モニター装着開始 指示通りの酸素量投与
		日常生活77	日常生活77	日常生活77
注射				全身麻酔セット OPE点滴
内服薬		お薬手帳と持参薬の受け取りと鑑別		
指示確認	持参薬の有無	持参薬の鑑別		
		持参薬の指示確認	持参薬全て続行（鎮痛剤の重複、抗生剤内服あればDrへ確認）	術日内服は血糖降下薬以外全て続行（内服あれば朝7時まで配薬）
説明・指導		入院初インタビュー	術前初インタビュー	
観察				
退院調整				
入院書類	入院申し込み書、保険外給付サービス利用同意書の提出	入院申し込み書、保険外給付サービス利用同意書の説明		
	入院診療計画書の記入・受け取り	入院診療計画書の記入と受け取り 入院診療計画書 手術承諾書 麻酔同意書 肺塞栓予防の同意書		
	保険外給付サービス申し込み書の確認	入院診療計画書の記入と受け取り 保険外給付サービス利用申し込みの確認・提出		
	問診票	問診票の記入・入力		
条件付き 手術 バリエーション				
退院支援	初回面談	スクリーニングシート の記入	患者本人、家族との初回面談	
		問診票のコピー 退院支援カンファレンス 用紙の記入		
条件付き指示		不穏時：レネス 不安時：アロギラム 便秘時①：カネ-GE60 便秘時②：レカミン 便秘時③：セナド 発熱・疼痛時①：加ナール 発熱・疼痛時②：アセチ 疼痛時③：ロキソ 軟膏：ケナミン軟膏 点滴ロック用：生食ロック10ml 下肢エコー	不穏時：レネス 不安時：アロギラム 便秘時①：カネ-GE60 便秘時②：レカミン 便秘時③：セナド 発熱・疼痛時①：加ナール 発熱・疼痛時②：アセチ 疼痛時③：ロキソ 軟膏：ケナミン軟膏 点滴ロック用：生食ロック10ml 下肢エコー	不穏時：レネス 不安時：アロギラム 便秘時①：カネ-GE60 便秘時②：レカミン 便秘時③：セナド 発熱・疼痛時①：加ナール 発熱・疼痛時②：アセチ 疼痛時③：ロキソ 軟膏：ケナミン軟膏 点滴ロック用：生食ロック10ml 下肢エコー

