

ステップ名称		手術前日 入院1日目	手術当日：術前 入院2日目	手術当日：術後 入院2日目	手術後1日目 入院3日目
		1日目	2日目		3日目
合併症	客観的観察			創部の出血がない	創部の出血がない
患者状態	症状			ドレーン挿入部のトラブルがない	ドレーン挿入部のトラブルがない
生活動作	活動			疼痛コントロールができています	疼痛コントロールができています
				術後の安静が守れる	早期離床ができる
知識・理解	術前	手術に対する準備ができる	手術に対する準備ができる		
	術後				
	退院時				
観察項目		睡眠	睡眠	睡眠	睡眠
		しびれ	しびれ	疼痛	疼痛
		疼痛	疼痛	しびれ	しびれ
		不安	不安	心電図モニター波形	心電図モニター波形
				出血（創部）	出血（創部）
検査結果			嘔気	嘔気	
			嘔吐	嘔吐	
検査	血液検査				
	放射線				
	生理検査				
	血管造影				
処方					
処置	看護				
				 術後、モニター装着	 モニター終了
				 手術後、フットポンプ装着（血栓ある場合は、要指示確認）	 朝6時にバルン抜去
				 弾性ストッキング装着	 離床可の指示受けたら、フットポンプ除去
					
				 BP140以上ニカルジピン4mL/H～開始。110<BP<140目標で、2mLずつup、down	
				 ドレーン排液200mL以上でDr. call	
				 疼痛時 アセチア投与	
	透析				
注射					
食事	 21時以降禁食	 朝7時まで飲水（お茶・水・スポーツドリンク）可 午後から手術の場合は10時まで飲水可	 朝から欠食。術後4時間後飲水可。	 朝から食事、内服可。串刺食にする。	
安静度	 フリー		 術後ベッド上：首が動かないように砂嚢で固定。アイスノン枕使用	 レントゲン確認。指示確認し、カラー装着してベッドアップ可	
清潔					
指導	医師	 入院診療計画書 術前チェックリスト作成			
	看護	弾性ストッキング準備			
		ソフトネックカラー準備			
		後頸部除毛（耳下線から下）			
		同意書の確認 術後の個室の説明&個室同意書 術前オリエンテーション			
栄養指導 服薬指導					
看護問題					
観察項目					
確認項目					
リハビリ					
退院調整					
カルテ					
条件付き指示		ニカルジピン希釈	ニカルジピン希釈	ニカルジピン希釈	ニカルジピン希釈
		痙攣、鎮静	痙攣、鎮静	痙攣、鎮静	痙攣、鎮静
		血圧上昇時	血圧上昇時	血圧上昇時	血圧上昇時
		不眠、不穏時	不眠、不穏時	不眠、不穏時	不眠、不穏時
		嘔気時	嘔気時	嘔気時	嘔気時
		疼痛時	疼痛時	疼痛時	疼痛時
		発熱時	発熱時	発熱時	発熱時
			押し水	押し水	

ステップ名称		術後2日目 入院4日目	術後3日目 入院5日目	術後4日目 入院6日目	術後5日目 入院7日目
		4日目	5日目	6日目	7日目
合併症	客観的観察				
患者状態	症状	創痛コントロールができています	創痛コントロールができています	創痛コントロールができています	創痛コントロールができています
生活動作	活動	早期離床ができる ADLの拡大に努める	ADLの拡大に努める	ADLの拡大に努める	ADLの拡大に努める
知識・理解	術前				
	術後	合併症なく過ごすことができる 日常生活の注意点が実行できる	合併症なく過ごすことができる 日常生活の注意点が実行できる	合併症なく過ごすことができる 日常生活の注意点が実行できる	合併症なく過ごすことができる 日常生活の注意点が実行できる
	退院時				
観察項目		睡眠 疼痛 しびれ 出血（創部）	睡眠 疼痛 しびれ	睡眠 疼痛 しびれ	睡眠 疼痛 しびれ 不安
検査結果					
検査	血液検査				
	放射線				
	生理検査				
	血管造影				
処方					
処置					
	看護				
					
透析					
注射					
食事					
安静度					
清潔					
指導	医師				
	看護				
	栄養指導 服薬指導				
看護問題					
観察項目					
確認項目					
リハビリ					
退院調整					
カルテ					
条件付き指示		ニカルジピン希釈	ニカルジピン希釈	ニカルジピン希釈	ニカルジピン希釈
		痙攣、鎮静	痙攣、鎮静	痙攣、鎮静	痙攣、鎮静
		血圧上昇時	痙攣、鎮静	血圧上昇時	血圧上昇時
		不眠、不穏時	血圧上昇時	不眠、不穏時	不眠、不穏時
		嘔気時	不眠、不穏時	嘔気時	嘔気時
		疼痛時	嘔気時	疼痛時	疼痛時
		発熱時	疼痛時	発熱時	発熱時
		押し水	発熱時	押し水	押し水
		押し水			

ステップ名称		術後6日目 入院8日目	術後7日目 入院9日目	術後8日目 退院日
		8日目	9日目	10日目
合併症	客観的観察			
患者状態	症状	創痛コントロールができています	創痛コントロールができています	
生活動作	活動	ADLの拡大に努める	ADLの拡大に努める	
知識・理解	術前			
	術後	合併症なく過ごすことができる 日常生活の注意点が実行できる	合併症なく過ごすことができる 日常生活の注意点が実行できる	退院が可能な状態であることを、本人・ 家族が理解している
	退院時			退院後の留意点が理解できる 退院に対して不安がない
観察項目		睡眠 疼痛 しびれ 不安	睡眠 疼痛 しびれ 不安	不安 睡眠 しびれ
検査結果				
検査	血液検査			
	放射線			
	生理検査			
	血管造影			
処方		⇒	⇒	
処置	看護	⇒	⇒	⇒
		⇒	⇒	⇒
		⇒	⇒	⇒
	透析			
注射				
食事				
安静度				
清潔				
指導	医師		 抜糸予定	
	看護			
	栄養指導 服薬指導			
看護問題				
観察項目				
確認項目				
リハビリ				
退院調整				
カルテ				
条件付き指示		ニカルジピン希釈	ニカルジピン希釈	ニカルジピン希釈
		痙攣、鎮静	痙攣、鎮静	痙攣、鎮静
		血圧上昇時	血圧上昇時	血圧上昇時
		不眠、不穏時	不眠、不穏時	不眠、不穏時
		嘔気時	嘔気時	嘔気時
		疼痛時	疼痛時	疼痛時
		発熱時	発熱時	発熱時
		押し水	押し水	押し水