






ステップ名称		入院日	手術前日	手術日	ope後1日目	
		1日目	2日目	3日目	4日目	
合併症	自覚症状	胸痛・胸部不快感がない	胸痛・胸部不快感がない	胸痛・胸部不快感がない	胸痛・胸部不快感がない 穿刺部位の痛みがない 苦痛・創部痛のコントロールができる	
	客観的観察				穿刺部からの出血がない 穿刺部位の血腫がない 創部の出血がない 創部の発赤・腫脹がない	
患者状態	症状				悪心・嘔吐がない 呼吸が安定している	
	バイタル				循環動態が安定している 38.0℃以上の発熱がない	
	その他	夜間良眠ができる 手術・処置に対する不安が軽減している		夜間良眠ができる 手術・処置に対する不安が軽減している	夜間良眠ができる 麻酔から全覚醒している	
生活動作	活動				指示された安静が守られている ADLの拡大に努める	
	経口				水分摂取ができる	
	リハビリ				リハビリに意欲がある リハビリができる	
知識・理解	術前	手術前の絶飲食が守れる	手術前の絶飲食が守れる	手術前の絶飲食が守れる		
		術前の処置について理解している	術前の処置について理解している	術前の処置について理解している		
		術前準備が整っている	術前準備が整っている	術前準備が整っている		
	術後	手術の心構えができています	手術の心構えができています	手術の心構えができています		
		不安の内容を表出できる	不安の内容を表出できる	不安の内容を表出できる		
		手術に対する準備ができる	予定通り手術を受けることができる	手術に対する準備ができる		
退院時	手術に対する不安を軽減できる	手術に対する準備ができる	手術に対する不安を軽減できる			
		手術に対する不安を軽減できる				
観察項目		息切れ（労作時） 浮腫 眩暈 冷汗	息切れ（労作時） 胸部不快 睡眠 浮腫 末梢冷感（下肢） 眩暈	息切れ（労作時） 浮腫 眩暈 冷汗	体温（38度以下） 疼痛（創部） 眩暈 冷汗	
	検査結果					
	検査	血液検査	 採血・検尿		 採血	 採血
		放射線	 胸写（立位）		 レントゲン（OPE室・帰室時6時間後）	 胸写・腹単（ポータブル）
生理検査				 術中エコー/術後ICU帰室時十二誘導・採血/術後6時間後採血		
血管造影						
処方				 処方		
処置	看護 透析					
注射				 術前点滴（ソルアセトF・抗生剤手術室へ持ち込み） 術後点滴（メイン流速指示あり）	 末梢メイン（3本管理）・抗生剤3回	
食事		 エネルギー塩分コントロール食		 朝から欠食		
安静度 清潔						
指導	医師			 朝分内服中止		
	看護					
	栄養指導					
	服薬指導					
看護問題						
観察項目						
確認項目		 術前説明・同意書（OPE同意書関係は医師が別印刷）				
リハビリ		 術前リハビリ				
退院調整						
カルテ		 入院オーダー				
条件付き指示		発熱時	発熱時	発熱時	発熱時	
		疼痛時	アルブミン	アルブミン	アルブミン	

ステップ名称	入院日	手術前日	手術日	ope後1日目
	1日目	2日目	3日目	4日目
条件付き指示	嘔気時	フサン	フサン	フサン
	不眠、不穏時	ナトリウム	ナトリウム	ナトリウム
	便秘時	コアテック	コアテック	コアテック
	痙攣、鎮静	抗不整脈薬	抗不整脈薬	抗不整脈薬
	血圧上昇時	カデックス	カデックス	カデックス
	低血糖時	点滴	点滴	点滴
	軟膏	レントゲン	レントゲン	レントゲン
	アルブミン	A5イン	A5イン	A5イン
	代用血漿製剤	吸入	吸入	吸入
	維持液	疼痛時	疼痛時	疼痛時
	ブドウ糖	代用血漿製剤	代用血漿製剤	代用血漿製剤
	ソルデム1	ヘパリン	ヘパリン	ヘパリン
	細胞外液	カルシウム	カルシウム	カルシウム
	フサン	DOA	DOA	DOA
	ヘパリン	アンカロン	アンカロン	アンカロン
	ナトリウム	メイロン	メイロン	メイロン
	カルシウム	プロペト	プロペト	プロペト
	マグネシウム	内服	内服	内服
	低カリウム	培養	培養	培養
	高カリウム	嘔気時	嘔気時	嘔気時
	コアテック	維持液	維持液	維持液
	DOA	マグネシウム	マグネシウム	マグネシウム
	DOB	DOB	DOB	DOB
	ボスミン	頻脈	頻脈	頻脈
	ノルアド	鎮静薬	鎮静薬	鎮静薬
	抗不整脈薬	メイスパン	メイスパン	メイスパン
	アンカロン	血ガス	血ガス	血ガス
	頻脈	不眠、不穏時	不眠、不穏時	不眠、不穏時
	メイロン	ブドウ糖	ブドウ糖	ブドウ糖
	鎮静薬	低カリウム	低カリウム	低カリウム
	薬剤アレルギー	ボスミン	ボスミン	ボスミン
	インスリン	薬剤アレルギー	薬剤アレルギー	薬剤アレルギー
	プロタミン	採血	採血	採血
	ニコランジル	便秘時	便秘時	便秘時
	インスリン持注	ソルデム1	ソルデム1	ソルデム1
	シベレスタット	高カリウム	高カリウム	高カリウム
	利尿剤	ノルアド	ノルアド	ノルアド
	レントゲン	ECG	ECG	ECG
	培養	痙攣、鎮静	痙攣、鎮静	痙攣、鎮静
	血ガス	細胞外液	細胞外液	細胞外液
	採血	インスリン	インスリン	インスリン
	ECG	血圧上昇時	血圧上昇時	血圧上昇時
	A5イン	プロタミン	プロタミン	プロタミン
	吸入	低血糖時	低血糖時	低血糖時
	(ER処置用)吸入薬	ニコランジル	ニコランジル	ニコランジル
	カデックス	軟膏	軟膏	軟膏
	プロペト	インスリン持注	インスリン持注	インスリン持注
	メイスパン	シベレスタット	シベレスタット	シベレスタット
	点滴	利尿剤	利尿剤	利尿剤
	内服			

ステップ名称		ope後2日目	ope後3日目	ope後4日目	ope後5日目
		5日目	6日目	7日目	8日目
合併症	自覚症状	苦痛・創部痛のコントロールができる	苦痛・創部痛のコントロールができる	苦痛・創部痛のコントロールができる	苦痛・創部痛のコントロールができる
	客観的観察	創部の発赤・腫脹がない	創部の発赤・腫脹がない	創部の発赤・腫脹がない	創部の発赤・腫脹がない
患者状態	症状				
	バイタル				
	その他				
生活動作	活動	ADLの拡大に努める	ADLの拡大に努める	ADLの拡大に努める	ADLの拡大に努める
	経口				
	リハビリ				
知識・理解	術前				
	術後	転倒リスクを理解でき、安全に歩行できる 合併症なく過ごすことができる	転倒リスクを理解でき、安全に歩行できる 合併症なく過ごすことができる	転倒リスクを理解でき、安全に歩行できる 合併症なく過ごすことができる	転倒リスクを理解でき、安全に歩行できる 合併症なく過ごすことができる
	退院時				
観察項目		疼痛（創部） 眩暈 冷汗	疼痛（創部） 眩暈 冷汗	疼痛（創部） 眩暈 冷汗	疼痛（創部） 眩暈 冷汗
検査結果					
検査	血液検査	 採血			 採血
	放射線	 胸写（ポータブル）			 胸写（一般）
	生理検査				 心エコー/十二誘導
	血管造影				
処方	 処方	 処方	 処方	 処方	
処置	看護 透析				
注射					
食事					
安静度					
清潔					
指導	医師				
	看護				
	栄養指導				
	服薬指導				
看護問題					
観察項目					
確認項目					
リハビリ					
退院調整					
カルテ					
条件付き指示		発熱時 アルブミン	発熱時 アルブミン	発熱時 アルブミン	発熱時 アルブミン

ステップ名称		ope後2日目	ope後3日目	ope後4日目	ope後5日目
		5日目	6日目	7日目	8日目
条件付き指示	フサン	フサン	フサン	フサン	フサン
	ナトリウム	ナトリウム	ナトリウム	ナトリウム	ナトリウム
	コアテック	コアテック	コアテック	コアテック	コアテック
	抗不整脈薬	抗不整脈薬	抗不整脈薬	抗不整脈薬	抗不整脈薬
	カデックス	カデックス	カデックス	カデックス	カデックス
	点滴	点滴	点滴	点滴	点滴
	レントゲン	レントゲン	レントゲン	レントゲン	レントゲン
	A5i	A5i	A5i	A5i	A5i
	吸入	吸入	吸入	吸入	吸入
	疼痛時	疼痛時	疼痛時	疼痛時	疼痛時
	代用血漿製剤	代用血漿製剤	代用血漿製剤	代用血漿製剤	代用血漿製剤
	ヘパリン	ヘパリン	ヘパリン	ヘパリン	ヘパリン
	カルシウム	カルシウム	カルシウム	カルシウム	カルシウム
	DOA	DOA	DOA	DOA	DOA
	アンカロン	アンカロン	アンカロン	アンカロン	アンカロン
	メイロン	メイロン	メイロン	メイロン	メイロン
	プロペト	プロペト	プロペト	プロペト	プロペト
	内服	内服	内服	内服	内服
	培養	培養	培養	培養	培養
	嘔気時	嘔気時	嘔気時	嘔気時	嘔気時
	維持液	維持液	維持液	維持液	維持液
	マグネシウム	マグネシウム	マグネシウム	マグネシウム	マグネシウム
	DOB	DOB	DOB	DOB	DOB
	頻脈	頻脈	頻脈	頻脈	頻脈
	鎮静薬	鎮静薬	鎮静薬	鎮静薬	鎮静薬
	メイスパン	メイスパン	メイスパン	メイスパン	メイスパン
	血ガス	血ガス	血ガス	血ガス	血ガス
	不眠、不穏時	不眠、不穏時	不眠、不穏時	不眠、不穏時	不眠、不穏時
	ブドウ糖	ブドウ糖	ブドウ糖	ブドウ糖	ブドウ糖
	低カリウム	低カリウム	低カリウム	低カリウム	低カリウム
	ボスミン	ボスミン	ボスミン	ボスミン	ボスミン
	薬剤アレルギー	薬剤アレルギー	薬剤アレルギー	薬剤アレルギー	薬剤アレルギー
	採血	採血	採血	採血	採血
	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時
	ソルデム1	ソルデム1	ソルデム1	ソルデム1	ソルデム1
	高カリウム	高カリウム	高カリウム	高カリウム	高カリウム
	ノルアド	ノルアド	ノルアド	ノルアド	ノルアド
	ECG	ECG	ECG	ECG	ECG
	痙攣、鎮静	痙攣、鎮静	痙攣、鎮静	痙攣、鎮静	痙攣、鎮静
	細胞外液	細胞外液	細胞外液	細胞外液	細胞外液
	インスリン	インスリン	インスリン	インスリン	インスリン
	血圧上昇時	血圧上昇時	血圧上昇時	血圧上昇時	血圧上昇時
	プロタミン	プロタミン	プロタミン	プロタミン	プロタミン
	低血糖時	低血糖時	低血糖時	低血糖時	低血糖時
	ニコランジル	ニコランジル	ニコランジル	ニコランジル	ニコランジル
	軟膏	軟膏	軟膏	軟膏	軟膏
インスリン持注	インスリン持注	インスリン持注	インスリン持注	インスリン持注	
シベレスタット	シベレスタット	シベレスタット	シベレスタット	シベレスタット	
利尿剤	利尿剤	利尿剤	利尿剤	利尿剤	

ステップ名称		退院日	
		9日目	
合併症	自覚症状		
	客観的観察		
患者状態	症状		
	バイタル		
	その他		
生活動作	活動		
	経口		
	リハビリ		
知識・理解	術前		
	術後		
	退院時		退院が可能な状態であることを、本人・家族が理解している
			退院後の留意点が理解できる
		退院に対して不安がない	
		退院後、本人・家族が創の状態を観察できる	
		外来定期通院を理解している	
		治療結果について理解している	
		清潔保持ができる	
観察項目			
検査結果			
検査	血液検査		
	放射線		
	生理検査		
	血管造影		
処方		⇒ 処方	
処置	看護		
	透析		
注射			
食事			
安静度			
清潔			
指導	医師		
	看護	⇒	
	栄養指導		
	服薬指導		
看護問題			
観察項目			
確認項目			
リハビリ			
退院調整			
カルテ			
条件付き指示			

ステップ名称	退院日
	9日目
条件付き指示	