



ステップ名称	手術前日	手術当日 手術前	手術当日 手術後	術後1日目	
	1日目		2日目	3日目	
合併症	自覚症状	苦痛・創部痛のコントロールができる 創部の出血がない	苦痛・創部痛のコントロールができる 創部の出血がない	苦痛・創部痛のコントロールができる 創部の出血がない	
	客観的観察	創部の発赤・腫脹がない 術後神経障害がない	創部の発赤・腫脹がない 術後神経障害がない	創部の発赤・腫脹がない 術後神経障害がない	
生活動作	活動 経口	シャワー浴ができる 水分摂取が問題なくできる			
知識・理解	術前		手術前の絶飲食が守れる 手術に対する不安を軽減できる		
	検査前日	手術の準備ができる 本人及び家族が治療計画を理解している			
	入院時	絶飲食について理解している			
観察項目		疼痛 しびれ 可動性（足趾） 熱感 腫脹 動脈触知（左足背動脈） 動脈触知（右足背動脈） 睡眠	疼痛 しびれ 可動性（足趾） 熱感 腫脹 動脈触知（左足背動脈） 動脈触知（右足背動脈） 睡眠	睡眠 疼痛 腫脹 しびれ 熱感 出血（創部） 心電図モニター波形 呼吸困難感	
				睡眠 疼痛（創部） 疼痛 熱感 腫脹 可動性（足趾） しびれ 動脈触知（左足背動脈） 出血（創部） 動脈触知（右足背動脈） 心電図モニター波形 呼吸困難感	
	検査結果				
	食事	21時以降絶食	7時以降絶飲食	絶飲食	常食
	安静度			ベット上安静 下肢挙上+アイシング	安静度Dr確認
	排泄				
	清潔	シャワー浴	清拭後、手術着に更衣		
	検査			OPE後X-P	一般採血（Ca、Pを含む） 骨代謝マーカー AMIレントゲン・CT
治療処置	点滴ルート確保		バイタルサイン測定 心電図モニター装着開始 指示通りの酸素量投与	バイタルサイン測定 問題なければ朝に心電図モニター-off	
	弾性ストッキング装着		全身麻酔セット	腰麻の場合はマルチOFF	
薬剤		降圧剤のみ内服（SKIP出来なさそうな薬は要確認）	骨粗鬆症治療歴の確認（持参薬を含む）	内服全て再開	
		OPE点滴（透析、心不全のある方は要確認）		鎮痛薬開始	
				OPE後点滴	
説明・指導	術前オリエンテーション			禁忌動作 生活指導	
				栄養評価 問題点の抽出 食事調整 栄養指導計画書の作成	
観察	患肢観察	患肢観察	患肢観察	MMSEの実施	
				歯科受診歴の確認	
				患肢観察	
糖尿病					
書類	手術同意書の確認。 術前チェックリストの確認			転倒リスク評価 （テンプレート実施）	
手術					
リハビリ				リハビリオーダー 転倒リスク評価 腓骨神経麻痺の評価	
カルテ				転倒リスク評価 カルテ記載 （テンプレート実施）	
				歯科受診歴の有無 カルテ記載	
転倒・転落				転倒リスク評価の実施 （テンプレート実施）	
自己管理					
条件付き指示					

ステップ名称		術後2日目	術後3日目	術後4日目	術後5日目
		4日目	5日目	6日目	7日目
合併症	自覚症状	苦痛・創部痛のコントロールができる 創部の出血がない	苦痛・創部痛のコントロールができる 創部の出血がない	苦痛・創部痛のコントロールができる 創部の出血がない	苦痛・創部痛のコントロールができる 創部の出血がない
	客観的観察	創部の発赤・腫脹がない 術後神経障害がない	創部の発赤・腫脹がない 術後神経障害がない	創部の発赤・腫脹がない 術後神経障害がない	創部の発赤・腫脹がない 術後神経障害がない
生活動作	活動 経口				
知識・理解	術前				
	検査前日				
	入院時				
観察項目	疼痛（創部）				
	熱感				
	腫脹				
	可動性（足趾）				
	動脈触知（左足背動脈）				
	動脈触知（右足背動脈）				
	睡眠 しびれ				
検査結果					
食事					
安静度					
排泄					
清潔					
検査			 骨密度 椎体X-P		
治療処置	 術後処置	➡ 術後処置	➡ 術後処置	➡ 術後処置	
薬剤	➡ 鎮痛薬開始	➡ 鎮痛薬開始	➡ 鎮痛薬開始	 一般採血、骨代謝マーカー、BMDの結果より治療薬の検討 ➡ 鎮痛薬開始	
説明・指導					
観察	 患肢観察	 患肢観察	 患肢観察	 FRAX評価 (ワードパレット参照)  患肢観察	
糖尿病					
書類					
手術					
リハビリ					
カルテ					
転倒・転落					
自己管理					
条件付き指示					

ステップ名称		術後6日目	術後7日目	術後8日目	術後9日目
		8日目	9日目	10日目	11日目
合併症	自覚症状	苦痛・創部痛のコントロールができる 創部の出血がない	苦痛・創部痛のコントロールができる 創部の出血がない	苦痛・創部痛のコントロールができる 創部の出血がない	苦痛・創部痛のコントロールができる 創部の出血がない
	客観的観察	創部の発赤・腫脹がない 術後神経障害がない	創部の発赤・腫脹がない 術後神経障害がない	創部の発赤・腫脹がない 術後神経障害がない	創部の発赤・腫脹がない 術後神経障害がない
生活動作	活動 経口				
知識・理解	術前				
	検査前日				
	入院時				
観察項目	疼痛（創部）				
	熱感				
	腫脹				
	可動性（足趾）				
	動脈触知（左足背動脈）				
	動脈触知（右足背動脈）				
	嘔気				
	睡眠 しびれ				
検査結果					
食事					
安静度					
排泄					
清潔					
検査					
治療処置		⇒ 術後処置	⇒ 術後処置	⇒ 術後処置	⇒ 術後処置
薬剤	 骨粗鬆症治療薬開始（座位保てない患者は要確認）	⇒ 骨粗鬆症治療薬開始（座位保てない患者は要確認）	⇒ 骨粗鬆症治療薬開始（座位保てない患者は要確認）	⇒ 骨粗鬆症治療薬開始（座位保てない患者は要確認）	⇒ 骨粗鬆症治療薬開始（座位保てない患者は要確認）
	⇒ 鎮痛薬開始	⇒ 鎮痛薬開始			
説明・指導	 骨粗鬆症治療薬の服用意義を説明する				
観察	 患肢観察	 薬剤の副作用	 薬剤の副作用	 薬剤の副作用	
		 患肢観察	 患肢観察	 患肢観察	
糖尿病					
書類					
手術					
リハビリ					
カルテ					
転倒・転落					
自己管理					
条件付き指示					

ステップ名称		術後10日目	術後11日目	術後12日目	術後13日目
		12日目	13日目	14日目	15日目
合併症	自覚症状	苦痛・創部痛のコントロールができる 創部の出血がない	苦痛・創部痛のコントロールができる 創部の出血がない	苦痛・創部痛のコントロールができる 創部の出血がない	苦痛・創部痛のコントロールができる 創部の出血がない
	客観的観察	創部の発赤・腫脹がない 術後神経障害がない	創部の発赤・腫脹がない 術後神経障害がない	創部の発赤・腫脹がない 術後神経障害がない	創部の発赤・腫脹がない 術後神経障害がない
生活動作	活動 経口				
知識・理解	術前				
	検査前日				
	入院時				
観察項目	疼痛（創部）				
	熱感				
	腫脹				
	可動性（足趾）				
	動脈触知（左足背動脈）				
	動脈触知（右足背動脈）				
	嘔気				
	睡眠 しびれ				
検査結果					
食事					
安静度					
排泄					
清潔					
検査					
治療処置	⇒ 術後処置	⇒ 術後処置	⇒ 術後処置	⇒ 術後処置	
	 茶テープ変更後シャワー浴確認	⇒  茶テープ変更後シャワー浴確認	⇒  茶テープ変更後シャワー浴確認	⇒  茶テープ変更後シャワー浴確認	
薬剤	⇒  骨粗鬆症治療薬開始（座位保てない患者は要確認）	⇒  骨粗鬆症治療薬開始（座位保てない患者は要確認）	⇒  骨粗鬆症治療薬開始（座位保てない患者は要確認）	⇒  骨粗鬆症治療薬開始（座位保てない患者は要確認）	
説明・指導					
観察	 薬剤の副作用	 薬剤の副作用	 薬剤の副作用	 薬剤の副作用	
	 患肢観察	 患肢観察	 患肢観察	 患肢観察	
糖尿病					
書類					
手術					
リハビリ					
カルテ					
転倒・転落					
自己管理					
条件付き指示					



ステップ名称		術後14日目
		16日目
合併症	自覚症状	苦痛・創部痛のコントロールができる
	客観的観察	創部の出血がない 創部の発赤・腫脹がない 術後神経障害がない
生活動作	活動 経口	
知識・理解	術前	
	検査前日	
	入院時	
観察項目		疼痛（創部）
		熱感
		腫脹
		可動性（足趾）
		動脈触知（左足背動脈）
		動脈触知（右足背動脈）
		嘔気 しびれ
検査結果		
食事		
安静度		
排泄		
清潔		
検査		
治療処置		➡ 術後処置
		➡ 茶テーブル変更後シャワー浴確認
薬剤		➡ 骨粗鬆症治療薬開始（座位保てない患者は要確認）
説明・指導		
観察		 薬剤の副作用
		 患肢観察
糖尿病		
書類		
手術		
リハビリ		
カルテ		
転倒・転落		
自己管理		
条件付き指示		