


ステップ名称		入院カテ前	カテ後退院
1日目			
アウトカム			
観察項目			
検査結果			
検査	血液検査	 CAG	
	放射線		
	生理検査		
	血管造影		
処方			
処置	看護	 入院オリエンテーション	 穿刺部安静について説明
		 術前オリエンテーション	 心電図モニター
		 胸部不快	 帰室時バイタル測定
		 冷汗	 帰室後 2 h 観察
		 不安	 帰室後 4 h 観察
		 緊張	 帰室後 6 h 観察
		 睡眠	 栄養指導(家族同席の有無)
		 造影剤アレルギー患者・喘息の患者、確認	 胸部不快
		 透析患者か、否か確認(点滴)	 冷汗
		 感染性心内膜炎の高リスクの患者、確認	 不安
			 緊張
			 睡眠
		透析	
注射			
食事		 エネルギー塩分コントロール食・常食	 エネルギー塩分コントロール食・おにぎり、一口大(大腿動脈穿刺の場合 串刺し食) 午前カテ 昼・夕 午後カテ 夕
安静度		 フリー	 帰室後 1 時間安静(トイレのみ可)、その後フリー(大腿動脈穿刺の場合心臓カテーテルプロコトールに準じて安静解除していく)
清潔		 入浴・シャワー浴	
指導	医師		
	看護		
	栄養指導		
	服薬指導		
看護問題			
観察項目			
確認項目			
リハビリ			
退院調整			
カルテ		 ネームバンドの装着(非アプローチ側)	 心臓カテーテルプロコトールに準じて圧迫解除していく
		 剃毛 ・橈骨動脈: 穿刺部周囲のみ ・上腕動脈: 穿刺部周囲のみ ・大腿動脈: 臍~両膝まで	 カテ後、状況に応じて点滴抜針(迷走神経反射があったPt・血圧が不安定なPt・腎機能の悪いPtは圧迫解除まで点滴継続)
		 穿刺部位の動脈触知確認 ・橈骨動脈: 左右確認 ・上腕動脈: 左右確認 ・大腿動脈: 左右確認、両側足背動脈確認(血管の走行に沿ってマーキング)	 ビグアナイド剤は退院2日後より再開
		アンギオシューズ用意	 退院時服薬指導
		 ビグアナイド剤の造影剤使用時2日前より中止を確認	 退院療養計画書
		 アセチルコリン負荷試験の予定がある場合 Ca拮抗剤・硝酸薬が2日前より中止されているか確認	 情報提供書(必要時)
		 入院診療計画書	CD-Rの有無
		カテーテル検査および血管造影に関する同意書(CAG) ヨード系造影剤を用いた造影検査に関する説明と同意書 造影剤問診票	ご報告書の有無
		 入院予約	
		 患者説明書	
		 着替え(検査着、アンギオシューズ)	
		 入室前に排泄を促す	
		 出棟時 点滴ライン20G針、20G適用輸液セット、三方活栓×2、逆流防止弁、エクステンションチューブ(75cm)×3	

ステップ名称		入院カテ前	カテ後退院
		1日目	
カルテ		 テルモ生食1000ml 1袋 投与速度：100ml/h 穿刺部の反対側より 手首周囲は穿刺不可	
		血管造影記録表	
		 CAG s t b PCI	
条件付き指示			