

ステップ名称		手術前日 入院1日目	手術当日：術前 入院2日目	手術当日：術後 入院2日目	手術後1日目 入院3日目	術後2日目 入院4日目
		1日目	2日目		3日目	4日目
合併症	客観的観察			創部の出血がない	創部の出血がない	
患者状態	症状			ドレーン挿入部のトラブルがない	ドレーン挿入部のトラブルがない	
生活動作	活動			疼痛コントロールができています	疼痛コントロールができています	創痛コントロールができています
知識・理解	術前	手術に対する準備ができる	手術に対する準備ができる			
	術後					合併症なく過ごすことができる
	退院時					
観察項目	睡眠	睡眠	睡眠	睡眠	睡眠	睡眠
	しびれ	しびれ	しびれ	疼痛	疼痛	疼痛
	疼痛	疼痛	疼痛	しびれ	しびれ	しびれ
	不安	不安	不安	心電図モニター波形	心電図モニター波形	出血（創部）
				出血（創部）	出血（創部）	
				嘔気	嘔気	
検査結果						
検査	血液検査					
	放射線					
	生理検査					
	血管造影					
処方						
処置	看護					
透析						
注射						
食事	21時以降禁食	朝7時まで飲水（お茶・水・スポーツドリンク）可 午後の手術の場合は朝10時まで飲	朝から欠食。術後4時間後飲水可。	朝から食事、内服可。串刺しにする。		
安静度	フリー			レントゲン確認。指示確認し、コルゲット装着して離床可。		
清潔						
指導	医師					
		術前チェックリスト作成				
		弾性ストッキング準備				
		必要時除毛				
		同意書の確認				
看護	術後の個室の説明&個室同意書					
	術前オリエンテーション					
栄養指導						
服薬指導						
看護問題						
観察項目						
確認項目						
リハビリ						
退院調整						
カルテ						
条件付き指示		便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時
		不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時
		鎮痛	鎮痛	鎮痛	鎮痛	鎮痛
			ニカルジピン希釈	便秘時	ニカルジピン希釈	ニカルジピン希釈
			痙攣、鎮静	不眠時	痙攣、鎮静	痙攣、鎮静
			血圧上昇時	鎮痛	血圧上昇時	血圧上昇時
			不眠、不穏時		不眠、不穏時	不眠、不穏時
			嘔気時		嘔気時	嘔気時
			疼痛時		疼痛時	疼痛時
			発熱時		発熱時	発熱時

