

ステップ名称		手術前日	手術当日 手術前	手術当日 手術後	術後1日目
		1日目	2日目		3日目
合併症	自覚症状			苦痛・創部痛のコントロールができる	苦痛・創部痛のコントロールができる
	客観的観察			創部の出血がない 創部の発赤・腫脹がない 術後神経障害がない	創部の出血がない 創部の発赤・腫脹がない 術後神経障害がない
生活動作	経口	水分摂取が問題なくできる			
知識・理解	術前		手術前の絶飲食が守れる 手術に対する不安を軽減できる		
	検査前日	手術の準備ができる			
	入院時	本人及び家族が治療計画を理解している 絶飲食について理解している			
観察項目		疼痛	疼痛	睡眠	睡眠
		しびれ	しびれ	疼痛	疼痛（創部）
		神経麻痺（腓骨神経）	神経麻痺（腓骨神経）	腫脹	疼痛
		可動性（足趾）	可動性（足趾）	しびれ	熱感
		熱感	熱感	熱感	腫脹
		腫脹	腫脹	出血（創部）	可動性（足趾）
		動脈触知（左足背動脈）	動脈触知（左足背動脈）	心電図モニター波形	しびれ
		動脈触知（右足背動脈）	動脈触知（右足背動脈）	呼吸困難感	動脈触知（左足背動脈）
					出血（創部）
					動脈触知（右足背動脈）
				心電図モニター波形	
				呼吸困難感	
検査結果					
食事		21時以降絶食	7時以降絶食	絶飲食	常食
安静度				ベッド上安静 下肢挙上+アイシング	安静度Dr確認
排泄					
清潔		シャワー浴	清拭後、手術着に更衣		
検査		下肢エコー、心エコー		OPE後X-P	一般採血（Ca、Pを含む） 骨代謝マーカー AMIにレントゲン・CT
治療処置		点滴ルート確保 膀胱留置カテーテル挿入		バイタルサイン測定 心電図モニター装着開始 指示通りの酸素量投与 全身麻酔セット	バイタルサイン測定 問題なければ朝に心電図モニターoff
薬剤			降圧剤のみ内服（SKIP出来なさらぬ薬は要確認） OPE点滴（透析、心不全のある方は要確認）	骨粗鬆症治療歴の確認（持参薬を含む）	内服全て再開 鎮痛薬開始 OPE後点滴
説明・指導		術前オリエンテーション			禁忌動作 生活指導 栄養評価 問題点の抽出 食事調整 栄養指導計画書の作成
観察				創部観察	創部観察
					MMSEの実施
					歯科受診歴の確認
糖尿病					
書類		手術同意書の確認。 術前チェックリストの確認			転倒リスク評価 （テンプレート実施） 文書管理より 骨粗鬆症治療に関する 同意書の確認
手術					
リハビリ					リハビリオーダー 転倒リスク評価 腓骨神経麻痺の評価
カルテ					転倒リスク評価 カルテ記載 （テンプレート実施） 歯科受診歴の有無 カルテ記載
転倒・転落					転倒リスク評価の実施 （テンプレート実施）
自己管理					
条件付き指示					





