

ステップ名称		入院日	手術当日		術後1日目
		1日目	2日目		3日目
			手術当日（手術前）	手術当日（手術後）	
患者状態	症状		■創痛コントロールができています		■創痛コントロールができています
	バイタル				■37.5℃以上の発熱がない ・<37.5℃
生活動作	活動		■術後の安静が守れる		■早期離床ができる
	経口				■ADLの拡大に努める
知識・理解	術前	■術前準備が整っている	■手術前の絶飲食が守れる		
		■手術の心構えができています	■手術の心構えができています		
		■手術に対する不安を軽減できる	■予定通り手術を受けることができる		
			■手術に対する不安を軽減できる		
	術後		■手術したことを受け入れている		■合併症なく過ごすことができる
			■創部感染を起こさない		■異常の早期発見と対処ができる
			■異常の早期発見と対処ができる		
	退院時				
第n病日					
観察項目		疼痛 不安 出血	疼痛 不安 出血 腸蠕動音	疼痛 不安 出血 腸蠕動音	
	検査結果				
	検査	内視鏡			
血液検査					 血液検査
放射線				 レントゲン	
生理検査					
血管造影					
処方		 眠剤、下剤内服			
処置	看護				
	透析				
注射			 術前点滴	 術後点滴	
食事		 夕食後より絶食 飲水可	 朝より絶飲食	 絶飲食	 朝から飲水開始、昼から食事開始
安静度		 病棟内歩行可	 病棟内歩行可	 ベッド上安静	 トイレ洗面可
清潔					
指導	医師	 持参薬確認 抗凝固薬中止確認		 術後血圧指示	 持参薬再開確認
					 術後血圧指示
	看護	 入院時オリエンテーション	 術衣着用	 フットポンプ装着	 朝Ba抜去
		 リストバンド装着	 弾性ストッキング着用	 必要時、電気毛布使用	 看護師見守りにて初回歩行実施
		 身長・体重測定		飲水開始は排ガス後から（少量の水で湿らす程度であれば腸蠕動音聴取後	 Dr処置にて脾の綿球OFF、ステリ大貼付
		 入院時バイタル測定			朝から飲水可、昼から食事開始
		 術前オリエンテーション			
		 剃毛（恥骨まで）・シャワー浴			
		 腹帯なし			
		 臍処置（オリーブオイル）			
	栄養指導				
	服薬指導				
看護問題					
観察項目					
確認項目					
リハビリ					
退院調整					
カルテ					
条件付き指示		発熱時	発熱時	 発熱時	発熱時
		疼痛時	血圧上昇時	 血圧上昇時	血圧上昇時
		嘔気時	疼痛時	 疼痛時	疼痛時
		尿量減少時	嘔気時	 嘔気時	嘔気時
		不眠時	尿量減少時	 尿量減少時	尿量減少時
			不眠時	 不眠時	不眠時

[illegible]