

ステップ名称		入院日	手術前日	手術日	ope後1日目	ope後2日目
		1日目	2日目	3日目	4日目	5日目
合併症	自覚症状	■胸痛・胸部不快感がない	■胸痛・胸部不快感がない	■胸痛・胸部不快感がない	■胸痛・胸部不快感がない	■苦痛・創部痛のコントロールができる
					■穿刺部位の痛みがない	
					■苦痛・創部痛のコントロールができる	
	客観的観察				■穿刺部からの出血がない・新規-評価基準	■創部の発赤・腫脹がない
					■穿刺部位の血腫がない	
					■創部の出血がない	
患者状態	症状				■悪心・嘔吐がない・新規-評価基準	
	バイタル				■呼吸が安定している	
					■循環動態が安定している・SpO2 95%<適正値・Na 150> 適正値	
	その他				■38.0℃以上の発熱がない・38℃以下	
		■夜間良眠ができる	■夜間良眠ができる	■夜間良眠ができる	■夜間良眠ができる	
		■手術・処置に対する不安が軽減している	■手術・処置に対する不安が軽減している	■手術・処置に対する不安が軽減している	■麻酔から全覚醒している	
生活動作	活動				■指示された安静が守られている	■ADLの拡大に努める
					■ADLの拡大に努める	
	経口				■水分摂取ができる	
	リハビリ				■リハビリに意欲がある	
					■リハビリができる	
知識・理解	術前	■手術前の絶飲食が守れる	■手術前の絶飲食が守れる	■手術前の絶飲食が守れる		
		■術前の処置について理解している	■術前の処置について理解している	■術前の処置について理解している		
		■術前準備が整っている	■術前準備が整っている	■術前準備が整っている		
		■手術の心構えができている	■手術の心構えができている	■手術の心構えができている		
		■不安の内容を表出できる	■不安の内容を表出できる	■不安の内容を表出できる		
		■手術に対する準備ができる	■予定通り手術を受けることができる	■手術に対する準備ができる		
		■手術に対する不安を軽減できる	■手術に対する準備ができる	■手術に対する不安を軽減できる		
			■手術に対する不安を軽減できる			
	術後				■疼痛・苦痛、気分不良を訴えることができる	■転倒リスクを理解でき、安全に歩行できる
					■転倒リスクを理解でき、安全に歩行できる	■合併症なく過ごすことができる
					■内服の必要性について理解している	
					■術後の安静について理解している	
					■創部感染を起こさない	
					■合併症なく過ごすことができる	
	退院時					
観察項目		息切れ（労作時）	息切れ（労作時）	息切れ（労作時）	体温（38度以下）	疼痛（創部）
		浮腫	胸部不快	浮腫	疼痛（創部）	眩暈
		眩暈	睡眠	眩暈	眩暈	冷汗
		冷汗	浮腫	冷汗	冷汗	
			冷汗			
			末梢冷感（下肢）			
			眩暈			
検査結果						

検査	内視鏡					
	血液検査	 採血・検尿	 採血・検尿	 採血	 採血	 採血
	放射線	 胸写（立位）	 胸写（立位）	 レントゲン（OPE室・帰室時6時間後）	 胸写・腹単（ポータブル）	 胸写（ポータブル）
	生理検査			 術中エコー/術後ICU帰室時十二誘導・採血/術後6時間後採血		
	血管造影					
処方					 処方	 処方
処置	看護					
	透析					
注射				 術前点滴（ソルアセトF・抗生剤手術室へ持ち込み）	 末梢メイン（3本管理）・抗生剤3回	
食事		 エネルギー塩分コントロール食	 エネルギー塩分コントロール食	 朝から欠食		
安静度						
清潔						
指導	医師			 朝分内服中止		
	看護					
	栄養指導					
	服薬指導					
看護問題						
観察項目						
確認項目		 術前説明・同意書（OPE同意書開（5分前読み出し））	 術前説明・同意書（OPE同意書開（5分前読み出し））			
リハビリ		 術前リハビリ	 術前リハビリ			
退院調整						
カルテ		 入院オーダー	 入院オーダー			
条件付き指示						

ope後3日目	ope後4日目	ope後5日目	退院日
6日目	7日目	8日目	9日目
■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	
■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない	
■ADLの拡大に努める	■ADLの拡大に努める	■ADLの拡大に努める	
■転倒リスクを理解でき、安全に歩行できる	■転倒リスクを理解でき、安全に歩行できる	■転倒リスクを理解でき、安全に歩行できる	
■合併症なく過ごすることができる	■合併症なく過ごすることができる	■合併症なく過ごすることができる	
			■退院が可能な状態であることを、本人・家族が理解している ・新規-評価基準
			■退院後の留意点が理解できる ・新規-評価基準
			■退院に対して不安がない ・新規-評価基準
			■退院後、本人・家族が創の状態を観察できる
			■外来定期通院を理解している
			■治療結果について理解している
			■清潔保持ができる
疼痛（創部）	疼痛（創部）	疼痛（創部）	
眩暈	眩暈	眩暈	
冷汗	冷汗	冷汗	

[illegible]