

ステップ名称		前日	手術前	手術前	入院1日 手術後	術後 1日目 退院日
		1日目	2日目		3日目	4日目
合併症	自覚症状				■血尿がない	
知識・理解	術前	■術前準備が整っている	■手術前の絶飲食が守れる	■手術前の絶飲食が守れる		
		■手術の心構えができています	■術前準備が整っている	■術前準備が整っている		
			■手術の心構えができています	■手術の心構えができています		
			■予定通り手術を受けることができる	■予定通り手術を受けることができる		
	術後				■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる
						■退院が可能な状態であることを、本人・家族が理解している ・新規-評価基準
	退院時					■退院後の留意点が理解できる ・新規-評価基準
						■退院に対して不安がない ・新規-評価基準
	入院時		■入院環境に慣れ、検査の受け入れができる	■入院環境に慣れ、検査の受け入れができる		
			■本人及び家族が治療計画を理解している ・新規-評価基準	■本人及び家族が治療計画を理解している ・新規-評価基準		
			■本人及び家族が手術・麻酔について理解している	■本人及び家族が手術・麻酔について理解している		
	第n病日					■問題なく退院できる
観察項目		血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	自尿	自尿
		残尿感	残尿感	残尿感	排尿障害	排尿障害
		排尿障害	排尿障害	排尿障害	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）
		不安	便秘	便秘	残尿感	残尿感
		尿量	不安	不安	疼痛	疼痛
検査結果			尿量	尿量	尿量	尿量
食事			当日の朝食事可 AM10時まで飲水のみ可 禁飲食	当日の朝食事可 AM10時まで飲水のみ可 禁飲食	食事、歩行は覚醒次第可能 です	常食または治療食
安静度			病棟内フリー	病棟内フリー		フリー
排泄			OPE入室前に排尿	OPE入室前に排尿	・排便確認（血便時はDrCall） ・腹満あれば導尿またはBa挿入	・排便確認（血便時はDrCall） ・腹満あれば導尿またはBa挿入
清潔						シャワー可
検査			外来検査結果確認	外来検査結果確認	検体提出確認	
治療処置			オベ後ベッドにはフラット オムツ 1枚・酸素マスクを垂れオ ソルアセトF500 術前 ソルアセトF500 術後① ソルアセトF500 術後② セファゾリン1g 手術 室待参 セファゾリン1g 術後 (18時 に投与)	オベ後ベッドにはフラット オムツ 1枚・酸素マスクを垂れオ ソルアセトF500 術前 ソルアセトF500 術後① ソルアセトF500 術後② セファゾリン1g 手術 室待参 セファゾリン1g 術後 (18時 に投与)	抗凝固・抗血小板薬以外は 直ぐに 再開OK. 抗凝固薬、抗血栓 薬はDr 確認。	
薬剤		内服全て続行。 OPE当日の内服も続行だが 抗血栓 薬は確認してください。糖 尿病薬 は夕食時SKIPしてくださ い。 糖尿病の人は血糖測定する				
説明・指導		外来で手術オリエンテー ション		外来で手術オリエンテー ション	排便時無理な怒責をかけない	排便時無理な怒責をかけない
		入院計画書		入院計画書		退院証明書
		手術後安静の必要性を指導		手術伝票確認		服薬指導
		手術承諾書・麻酔同意書回収確認		手術後安静の必要性を指導		10時退院
		手術後の必要物品の確認		手術承諾書・麻酔同意書回収確認		血尿、下血、発熱などの症状がある →病室に相談し、医師に
		入院時オリエンテーション		手術後の必要物品の確認		
		術中看護確認		入院時オリエンテーション		
観察		排尿障害 血尿 残尿感 排便 術前の不安 睡眠中	排尿障害 血尿 残尿感 排便 術前の不安 睡眠中	排尿障害 血尿 残尿感 排便 術前の不安 睡眠中	自尿 排尿障害 血尿 残尿感 血便 疼痛 睡眠中	自尿 排尿障害 血尿 残尿感 血便 疼痛 睡眠中
					KT38.5℃以上の発熱はDr コールし てください	KT38.5℃以上の発熱はDr コールし てください
糖尿病						
書類						
手術						
リハビリ						
カルテ						
転倒・転落						
自己管理						

条件付き指示		発熱時	発熱時	発熱時	発熱時	発熱時
		疼痛時	疼痛時	疼痛時	疼痛時	疼痛時
		不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時
		不穏時	不穏時	不穏時	不穏時	不穏時
		便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時
		嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時
		輸液	輸液	輸液	輸液	輸液
		押水	押水	押水	押水	押水
		血尿時	血尿時	血尿時	血尿時	血尿時
		カルチコール・GI療法	カルチコール・GI療法	カルチコール・GI療法	カルチコール・GI療法	カルチコール・GI療法
		GI持続	GI持続	GI持続	GI持続	GI持続
		ニカルジピンIV	ニカルジピンIV	ニカルジピンIV	ニカルジピンIV	ニカルジピンIV
		ニカルジピン持続	ニカルジピン持続	ニカルジピン持続	ニカルジピン持続	ニカルジピン持続
		フロセミドIV	フロセミドIV	フロセミドIV	フロセミドIV	フロセミドIV
		フロセミド持続	フロセミド持続	フロセミド持続	フロセミド持続	フロセミド持続
		デクスメデトミジン	デクスメデトミジン	デクスメデトミジン	デクスメデトミジン	デクスメデトミジン
		ノルアド・ビトレシン	ノルアド・ビトレシン	ノルアド・ビトレシン	ノルアド・ビトレシン	ノルアド・ビトレシン
		痙攣・鎮静	痙攣・鎮静	痙攣・鎮静	痙攣・鎮静	痙攣・鎮静
		一般採血	一般採血	一般採血	一般採血	一般採血
		血液ガス	血液ガス	血液ガス	血液ガス	血液ガス
		胸部レントゲン	胸部レントゲン	胸部レントゲン	胸部レントゲン	胸部レントゲン
		胸部ポータブル	胸部ポータブル	胸部ポータブル	胸部ポータブル	胸部ポータブル
		腹部レントゲン	腹部レントゲン	腹部レントゲン	腹部レントゲン	腹部レントゲン
		腹部ポータブル	腹部ポータブル	腹部ポータブル	腹部ポータブル	腹部ポータブル
		血培2セット	血培2セット	血培2セット	血培2セット	血培2セット
		尿培	尿培	尿培	尿培	尿培
		高血糖時 インスリン	高血糖時 インスリン	高血糖時 インスリン	高血糖時 インスリン	高血糖時 インスリン
		低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示
		プロベト	プロベト	プロベト	プロベト	プロベト
		亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏
		ロキソプロフェンテープ	ロキソプロフェンテープ	ロキソプロフェンテープ	ロキソプロフェンテープ	ロキソプロフェンテープ
			発熱時	発熱時	発熱時	発熱時
			疼痛時	疼痛時	疼痛時	疼痛時
			不眠時	不眠時	不眠時	不眠時
			不穏時	不穏時	不穏時	不穏時
			便秘時	便秘時	便秘時	便秘時
			嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時
			輸液	輸液	輸液	輸液
			押水	押水	押水	押水
			血尿時	血尿時	血尿時	血尿時
			カルチコール・GI療法	カルチコール・GI療法	カルチコール・GI療法	カルチコール・GI療法
			GI持続	GI持続	GI持続	GI持続
			ニカルジピンIV	ニカルジピンIV	ニカルジピンIV	ニカルジピンIV
			ニカルジピン持続	ニカルジピン持続	ニカルジピン持続	ニカルジピン持続
			フロセミドIV	フロセミドIV	フロセミドIV	フロセミドIV
			フロセミド持続	フロセミド持続	フロセミド持続	フロセミド持続
			デクスメデトミジン	デクスメデトミジン	デクスメデトミジン	デクスメデトミジン
			ノルアド・ビトレシン	ノルアド・ビトレシン	ノルアド・ビトレシン	ノルアド・ビトレシン
			痙攣・鎮静	痙攣・鎮静	痙攣・鎮静	痙攣・鎮静
			一般採血	一般採血	一般採血	一般採血
			血液ガス	血液ガス	血液ガス	血液ガス
			胸部レントゲン	胸部レントゲン	胸部レントゲン	胸部レントゲン
			胸部ポータブル	胸部ポータブル	胸部ポータブル	胸部ポータブル
			腹部レントゲン	腹部レントゲン	腹部レントゲン	腹部レントゲン
			腹部ポータブル	腹部ポータブル	腹部ポータブル	腹部ポータブル
			血培2セット	血培2セット	血培2セット	血培2セット
			尿培	尿培	尿培	尿培
			高血糖時 インスリン	高血糖時 インスリン	高血糖時 インスリン	高血糖時 インスリン
			低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示
			プロベト	プロベト	プロベト	プロベト
			亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏
			ロキソプロフェンテープ	ロキソプロフェンテープ	ロキソプロフェンテープ	ロキソプロフェンテープ
				尿閉時 導尿またはバルーン挿入（入りにく け		