

ステップ名称		手術前日（入院日）	手術当日 午前	手術当日 手術後
		1日目	2日目	
合併症	自覚症状	■血尿がない	■血尿がない	■苦痛・創部痛のコントロールができる
				■血尿がない
生活動作	活動			■ADLの拡大に努める
	排便・排尿			■膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している
知識・理解	術前		■術前準備が整っている	
			■手術の心構えができている	
			■手術に対する不安を軽減できる	
	入院時	■入院環境に慣れ、手術の受け入れができる		
		■本人及び家族が治療計画を理解している ・新規-評価基準		
		■本人及び家族が手術・麻酔について理解している		
	検査中		■手術がスムーズに行われる	
	検査後			■異常の早期発見と対処ができる
観察項目		排尿障害	排尿障害	血尿（血尿スケール）
		血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	尿量
		残尿感	残尿感	疼痛（下腹部）
		不安	不安	不穏状態
				睡眠
検査結果				
食事		 21時～絶飲食	 絶飲食	 4時間後から飲水可能。 内服、食事再開は確認。
安静度		 フリー	 病棟内フリー	 安静度術後確認
排泄				
清潔		 入浴、爪切り	 オペ着の中はオムツ装着。標準体 格でも基本はLサイズ使用して下	
		 更衣 環境整備	 更衣 環境整備	 更衣 環境整備
検査		 外来検査結果確認		
治療処置				 酸素3Lマスク
				 承諾書回収確認
				 Ba牽引する場合があるのでDr. へ確認をお願いします
				 弾性ストッキング
				 カテーテル内血尿確認

薬剤		 21時センナリド2T  必要時リスミー1T	 必要時常用薬服用 6時術前点滴開始  ①ソルアセトF500ml  ②ソルアセトF500ml	 持続点滴 ①ソリター-T3、500ml (80ml/h)+ カルバゾクロム100mg ②ソルアセトD500ml
		 内服全て続行。 当日の内服も続行だが抗血栓薬・糖尿病薬は確認してください。 糖尿病の人は血糖測定するの		 アセリオ8時間ごとに投与
		 レボフロキサシン250mg2錠内服	 レボフロキサシン250mg2錠内服	 レボフロキサシン250mg2錠内服
説明・指導		 麻酔、手術内容説明	 麻酔承諾書回収確認	
		 入院診療計画書	 承諾書回収確認	
		 入院時オリエンテーション	 手術必要物品確認	
		 手術必要物品説明		
		 術中看護確認		
		 承諾書回収確認		
		 ネームバンド		
		 排尿ケア依頼してください		
		 売店でDIBキャップを購入してください		
		 DIBキャップについてパンフレット指導を行う		
観察		 排尿障害 血尿 残尿感 尿量 術前の不安 めまい ふらつき SP02 入眠中 転倒、転落危険度	 排尿障害 血尿 残尿感 尿量 術前の不安 めまい ふらつき SP02 入眠中 転倒、転落危険度	 下腹部痛 Ba挿入部痛 Ba閉塞 外尿道口部の出血 転倒転落危険度 血尿スケール 尿量 SP02 不穏 入眠中
糖尿病				
書類				
手術			 オペ後ベッドにフラットオムツL1枚 酸素マスク を持って	
リハビリ				
カルテ				
転倒・転落				
自己管理				

条件付き指示		発熱時	⇒	発熱時	⇒	発熱時
		疼痛時	⇒	疼痛時	⇒	疼痛時
		不眠時	⇒	不眠時	⇒	不眠時
		不穏時	⇒	不穏時	⇒	不穏時
		便秘時	⇒	便秘時	⇒	便秘時
		嘔気・嘔吐時	⇒	嘔気・嘔吐時	⇒	嘔気・嘔吐時
		輸液	⇒	輸液	⇒	輸液
		押水	⇒	押水	⇒	押水
		血尿時	⇒	血尿時	⇒	血尿時
		カルチコール・GI療法	⇒	カルチコール・GI療法	⇒	カルチコール・GI療法
		GI持続	⇒	GI持続	⇒	GI持続
		ニカルジピンIV	⇒	ニカルジピンIV	⇒	ニカルジピンIV
		ニカルジピン持続	⇒	ニカルジピン持続	⇒	ニカルジピン持続
		フロセミドIV	⇒	フロセミドIV	⇒	フロセミドIV
		フロセミド持続	⇒	フロセミド持続	⇒	フロセミド持続
		デクスメドミジン	⇒	デクスメドミジン	⇒	デクスメドミジン
		ノルアド・ピトレシン	⇒	ノルアド・ピトレシン	⇒	ノルアド・ピトレシン
		痙攣、鎮静	⇒	痙攣、鎮静	⇒	痙攣、鎮静
		一般採血	⇒	一般採血	⇒	一般採血
		血液ガス	⇒	血液ガス	⇒	血液ガス
		胸部レントゲン	⇒	胸部レントゲン	⇒	胸部レントゲン
		胸部ポータブル	⇒	胸部ポータブル	⇒	胸部ポータブル
		腹部レントゲン	⇒	腹部レントゲン	⇒	腹部レントゲン
		腹部ポータブル	⇒	腹部ポータブル	⇒	腹部ポータブル
		血培2セット	⇒	血培2セット	⇒	血培2セット
		尿培	⇒	尿培	⇒	尿培
		高血糖時 インスリン	⇒	高血糖時 インスリン	⇒	高血糖時 インスリン
		低血糖指示	⇒	低血糖指示	⇒	低血糖指示
		プロベト	⇒	プロベト	⇒	プロベト
		亜鉛華軟膏	⇒	亜鉛華軟膏	⇒	亜鉛華軟膏
		ロキソプロフェンテープ	⇒	ロキソプロフェンテープ	⇒	ロキソプロフェンテープ

第1病日	第2病日	第3病日
3日目	4日目	5日目
■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる
■血尿がない	■血尿がない	■血尿がない
■ADLの拡大に努める	■ADLの拡大に努める	■ADLの拡大に努める
■膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している	■膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している	■膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している
■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる
血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）
不穏状態	不穏状態	不穏状態
疼痛（下腹部）	疼痛（下腹部）	疼痛（下腹部）
尿量	尿量	尿量
 朝 から希望食または治療食	 希望食または治療食	 希望食または治療食
 フリー	 フリー	 フリー
 回診後、シャワー	 回診後、シャワー	 シャワー
 更衣 環境整備	 更衣 環境整備	 更衣 環境整備
 陰部洗浄	 陰部洗浄	 陰部洗浄
 必要時Ba牽引解除		
 弾性ストッキングoff		
 カテーテル内血尿確認	 カテーテル内血尿確認	 カテーテル内血尿確認

[illegible]

→	発熱時	→	発熱時	→	発熱時
→	疼痛時	→	疼痛時	→	疼痛時
→	不眠時	→	不眠時	→	不眠時
→	不穏時	→	不穏時	→	不穏時
→	便秘時	→	便秘時	→	便秘時
→	嘔気・嘔吐時	→	嘔気・嘔吐時	→	嘔気・嘔吐時
→	輸液	→	輸液	→	輸液
→	押水	→	押水	→	押水
→	血尿時	→	血尿時	→	血尿時
→	カルチコール・GI療法	→	カルチコール・GI療法	→	カルチコール・GI療法
→	GI持続	→	GI持続	→	GI持続
→	ニカルジピンIV	→	ニカルジピンIV	→	ニカルジピンIV
→	ニカルジピン持続	→	ニカルジピン持続	→	ニカルジピン持続
→	フロセミドIV	→	フロセミドIV	→	フロセミドIV
→	フロセミド持続	→	フロセミド持続	→	フロセミド持続
→	デクスメドミジン	→	デクスメドミジン	→	デクスメドミジン
→	ノルアド・ピトレシン	→	ノルアド・ピトレシン	→	ノルアド・ピトレシン
→	痙攣、鎮静	→	痙攣、鎮静	→	痙攣、鎮静
→	一般採血	→	一般採血	→	一般採血
→	血液ガス	→	血液ガス	→	血液ガス
→	胸部レントゲン	→	胸部レントゲン	→	胸部レントゲン
→	胸部ポータブル	→	胸部ポータブル	→	胸部ポータブル
→	腹部レントゲン	→	腹部レントゲン	→	腹部レントゲン
→	腹部ポータブル	→	腹部ポータブル	→	腹部ポータブル
→	血培2セット	→	血培2セット	→	血培2セット
→	尿培	→	尿培	→	尿培
→	高血糖時 インスリン	→	高血糖時 インスリン	→	高血糖時 インスリン
→	低血糖指示	→	低血糖指示	→	低血糖指示
→	プロベト	→	プロベト	→	プロベト
→	亜鉛華軟膏	→	亜鉛華軟膏	→	亜鉛華軟膏
→	ロキソプロフェンテープ	→	ロキソプロフェンテープ	→	ロキソプロフェンテープ