

ステップ名称		前日	手術前	入院1日 手術後	術後1日目 退院日
		1日目	2日目		3日目
合併症	自覚症状			■血尿の増強がない	
				■血尿がない	
知識・理解	術前		■手術前の絶飲食が守れる		
			■術前準備が整っている		
			■手術の心構えができています		
			■予定通り手術を受けることができる		
	術後			■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる
	退院時				■退院が可能な状態であることを、本人・家族が理解している ・新規-評価基準
					■退院後の留意点が理解できる ・新規-評価基準
					■退院に対して不安がない ・新規-評価基準
	入院時	■入院環境に慣れ、検査の受け入れができる ■本人及び家族が治療計画を理解している ・新規-評価基準 ■本人及び家族が手術・麻酔について理解している	■入院環境に慣れ、検査の受け入れができる ■本人及び家族が治療計画を理解している ・新規-評価基準 ■本人及び家族が手術・麻酔について理解している		
	第n病日				■問題なく退院できる
観察項目		血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	自尿	自尿
		残尿感	残尿感	排尿障害	排尿障害
		排尿障害	排尿障害	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）
		便意	便意	残尿感	残尿感
		不安	不安	疼痛	疼痛
		尿量	尿量	尿量	尿量
検査結果					
食事			検査後まで禁飲食	食事、歩行は覚醒次第可能です	常食または治療食
安静度		 病棟内フリー	 病棟内フリー		 フリー
排泄			 OPE入室前に排尿。オムツ装着（リハパン不可）。オベ着に着替	 ・排便確認（血便時はDrCall） ・腹満あれば導尿またはBa挿入	 ・排便確認（血便時はDrCall） ・腹満あれば導尿またはBa挿入
清潔					 シャワー可
検査			 外来検査結果確認	 検体提出確認	
治療処置				 腹部エコー 術中	
薬剤		 入院時センシッド2T内服	 オベ後ベッドにはフラットオムツ1枚+酸素マスクを垂れエソラアセトF500ml 80ml/h アミカシン 500mg ルートは難しければ22Gでも	 手術後点滴、終了後抜針 ①ソラアセトD500ml+カルバソク ロムスルホン酸ナトリウム	
			 内服継続。ただし、抗凝固薬、抗血栓薬については医師確認	 抗血栓薬の再開日の確認。抗血栓薬、抗凝固薬を内服している	
			 レボフロキサシン500mg内服。	 レボフロキサシン500mg内服。	
説明・指導		 入院計画書	 入院計画書	 排便時無理な怒責をかけない	 排便時無理な怒責をかけない
		 手術伝票確認	 手術伝票確認	 初回のトイレは看護師付き添いで行きます。排尿の確認するため、排尿	 退院証明書
		 手術後安静の必要性を指導	 手術後安静の必要性を指導	 検査後の初回排尿後に残尿測定。300ml以上で導尿後Dr報告。	 服薬指導
		 手術承諾書・麻酔同意書回収確認	 手術承諾書・麻酔同意書回収確認		 10時退院
		 入院時手術オリエンテーション（パンフレットで説明）	 手術後の必要物品の確認		 血尿、下血、発熱などの症状があったら病室に相談してください
			 家族の付きそいは不要。ただし、連絡はつくようしておい		
			 排尿障害 血尿 残尿感 排便 術前の不安 睡眠中 血便	 排尿障害 血尿 残尿感 排便 術前の不安 睡眠中 血便	 排尿障害 血尿 残尿感 排便 術前の不安 睡眠中 血便

観察				 自尿 排尿障害 血尿 残尿感 血便 疼痛 睡眠中	 自尿 排尿障害 血尿 残尿感 血便 疼痛 睡眠中			
				 KT38. 5℃以上の発熱はDr コールし てください	 KT38. 5℃以上の発熱はDr コールし てください			
				 ENT日、次回診の確認を。				
糖尿病								
書類		 OPE室持参書類確認 ・承諾書 ・麻酔同意書・説明書 ・生検説明書	 手術申込書					
手術								
リハビリ								
カルテ								
転倒・転落								
自己管理								
条件付き指示		発熱時	⇒	発熱時	⇒	発熱時	⇒	発熱時
		疼痛時	⇒	疼痛時	⇒	疼痛時	⇒	疼痛時
		不眠時	⇒	不眠時	⇒	不眠時	⇒	不眠時
		不穏時	⇒	不穏時	⇒	不穏時	⇒	不穏時
		便秘時	⇒	便秘時	⇒	便秘時	⇒	便秘時
		嘔気・嘔吐時	⇒	嘔気・嘔吐時	⇒	嘔気・嘔吐時	⇒	嘔気・嘔吐時
		輸液	⇒	輸液	⇒	輸液	⇒	輸液
		押水	⇒	押水	⇒	押水	⇒	押水
		血尿時	⇒	血尿時	⇒	血尿時	⇒	血尿時
		カルチコール・GI療法	⇒	カルチコール・GI療法	⇒	カルチコール・GI療法	⇒	カルチコール・GI療法
		GI持続	⇒	GI持続	⇒	GI持続	⇒	GI持続
		ニカルジピンIV	⇒	ニカルジピンIV	⇒	ニカルジピンIV	⇒	ニカルジピンIV
		ニカルジピン持続	⇒	ニカルジピン持続	⇒	ニカルジピン持続	⇒	ニカルジピン持続
		フロセミドIV	⇒	フロセミドIV	⇒	フロセミドIV	⇒	フロセミドIV
		フロセミド持続	⇒	フロセミド持続	⇒	フロセミド持続	⇒	フロセミド持続
		デクスメデトミジン	⇒	デクスメデトミジン	⇒	デクスメデトミジン	⇒	デクスメデトミジン
		ノルアド・ビトレシン	⇒	ノルアド・ビトレシン	⇒	ノルアド・ビトレシン	⇒	ノルアド・ビトレシン
		痙攣・鎮静	⇒	痙攣・鎮静	⇒	痙攣・鎮静	⇒	痙攣・鎮静
		一般採血	⇒	一般採血	⇒	一般採血	⇒	一般採血
		血液ガス	⇒	血液ガス	⇒	血液ガス	⇒	血液ガス
		胸部レントゲン	⇒	胸部レントゲン	⇒	胸部レントゲン	⇒	胸部レントゲン
		胸部ポータブル	⇒	胸部ポータブル	⇒	胸部ポータブル	⇒	胸部ポータブル
		腹部レントゲン	⇒	腹部レントゲン	⇒	腹部レントゲン	⇒	腹部レントゲン
		腹部ポータブル	⇒	腹部ポータブル	⇒	腹部ポータブル	⇒	腹部ポータブル
		血培2セット	⇒	血培2セット	⇒	血培2セット	⇒	血培2セット
		尿培	⇒	尿培	⇒	尿培	⇒	尿培
		高血糖時 インスリン	⇒	高血糖時 インスリン	⇒	高血糖時 インスリン	⇒	高血糖時 インスリン
		低血糖指示	⇒	低血糖指示	⇒	低血糖指示	⇒	低血糖指示
		プロベト	⇒	プロベト	⇒	プロベト	⇒	プロベト
		亜鉛華軟膏	⇒	亜鉛華軟膏	⇒	亜鉛華軟膏	⇒	亜鉛華軟膏
		ロキソプロフェンテープ	⇒	ロキソプロフェンテープ	⇒	ロキソプロフェンテープ	⇒	ロキソプロフェンテープ
			排便なければGE60ml使用。Bp100以下であればDr確認。		尿閉時 導尿またはバルーン挿入（入りにく			