

ステップ名称		入院当日	手術当日 午前中	手術当日 手術後	第3病日	第4病日	第5病日
		1日目	2日目		3日目	4日目	5日目
合併症	自覚症状			■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる
				■血尿の増強がない	■血尿の増強がない	■血尿の増強がない	■血尿の増強がない
				■血尿がない	■血尿がない	■血尿がない	■血尿がない
生活動作	客観的観察			■創部の出血がない	■創部の出血がない	■創部の出血がない	■創部の出血がない
	活動			■ADLの拡大に努める	■ADLの拡大に努める	■ADLの拡大に努める	
知識・理解	排泄・排尿			■膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している	■膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している	■膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している	■膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している
	術前		■術前準備が整っている				
			■不安の内容を表出できる				
			■手術に対する準備ができる				
	術後						■尿路感染を起こさない
	退院時						
	入院時	■入院環境に慣れ、手術の受け入れができる					
	検査中		■手術がスムーズに行われる				
観察項目	検査後			■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる
	第n病日						
観察項目	残尿感	排尿障害	排尿障害	排尿障害	疼痛（下腹部）	疼痛（下腹部）	疼痛（下腹部）
	排尿障害	残尿感	残尿感	残尿感	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）
検査結果	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	尿量	尿量	尿量
	尿量	尿量	尿量	尿量			
食事	21時～絶飲食	朝から絶飲食	4時間後から飲水可能。内服再開は確認。	朝から食事開始 希望食または治療食	希望食	希望食	希望食
	安静度	フリー	病棟内フリー	ベット上安静	病棟歩行可	病棟フリー	フリー
排泄	入浴 爪切り			入浴 爪切り	入浴 爪切り	入浴 爪切り	入浴 爪切り
	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備
清潔	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備
	陰部洗浄	陰部洗浄	陰部洗浄	陰部洗浄	陰部洗浄	陰部洗浄	陰部洗浄
検査				血算、生化学			
治療処置	弾性ストッキング着用	モニター	弾性ストッキングoff	弾性ストッキングoff	弾性ストッキングoff	弾性ストッキングoff	弾性ストッキングoff
	カテーテル内血尿確認	カテーテル内血尿確認	カテーテル内血尿確認	カテーテル内血尿確認	カテーテル内血尿確認	カテーテル内血尿確認	カテーテル内血尿確認
薬剤	21時センシッド2T 必要時リズミール錠	必要時常用薬服用 6時術前点滴開始 ①ソルアセトF500ml ②ソルアセトF500ml	持続点滴 ①ソリタ-T3、500ml (80ml/h)+ カルバゾクロム100mg ②ソルアセトD500ml	ソリタ-T3、500ml+カルバゾクロム100mg (80ml/H) 終了抜針。			
	内服全て続行。OPE当日の内服も続行だが抗血栓薬は確認してください。糖尿病薬は夕食時SKIPしてください。	手術室持参生食2ポート 100ml+セファゾリンNa1g 1キット					
説明・指導	麻酔科医より説明			Ba留置中の注意点			
	入院時オリエンテーション						
	入院治療計画書						
	麻酔、手術内容説明						
	術中看護確認						
	手術必要物品説明						
	承諾書回収						
	畜尿方法の説明						
観察	排尿障害 残尿感 血尿 尿量 睡眠	排尿障害 残尿感 血尿 尿量 睡眠	下腹部痛 Ba挿入部違和感 血尿の有無 外尿道口部の出血 Baの閉塞の有無 呼吸器合併症の有無 尿量 睡眠	下腹部痛 Ba挿入部違和感 血尿の有無 外尿道口部の出血 Baの閉塞の有無 呼吸器合併症の有無 尿量 睡眠	下腹部痛 Ba挿入部違和感 血尿の有無 外尿道口部の出血 Baの閉塞の有無 呼吸器合併症の有無 尿量 睡眠	下腹部痛 Ba挿入部違和感 血尿の有無 外尿道口部の出血 Baの閉塞の有無 呼吸器合併症の有無 尿量 睡眠	下腹部痛 Ba挿入部違和感 血尿の有無 外尿道口部の出血 Baの閉塞の有無 呼吸器合併症の有無 尿量 睡眠
糖尿病							
手術		オペ後ベッドに酸素マスクを装着して下さい					
リハビリ							
カルテ							
転倒・転落							
自己管理							

案件付き指示		発熱時	発熱時	発熱時	発熱時	発熱時	発熱時
		疼痛時	疼痛時	疼痛時	疼痛時	疼痛時	疼痛時
		不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時
		不穏時	不穏時	不穏時	不穏時	不穏時	不穏時
		便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時
		嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時
		輸液	輸液	輸液	輸液	輸液	輸液
		押水	押水	押水	押水	押水	押水
		血尿時	血尿時	血尿時	血尿時	血尿時	血尿時
		カルチコール・GI療法	カルチコール・GI療法	カルチコール・GI療法	カルチコール・GI療法	カルチコール・GI療法	カルチコール・GI療法
		GI持続	GI持続	GI持続	GI持続	GI持続	GI持続
		ニカルジピンIV	ニカルジピンIV	ニカルジピンIV	ニカルジピンIV	ニカルジピンIV	ニカルジピンIV
		ニカルジピン持続	ニカルジピン持続	ニカルジピン持続	ニカルジピン持続	ニカルジピン持続	ニカルジピン持続
		フロセミドIV	フロセミドIV	フロセミドIV	フロセミドIV	フロセミドIV	フロセミドIV
		フロセミド持続	フロセミド持続	フロセミド持続	フロセミド持続	フロセミド持続	フロセミド持続
		デクスメトミジン	デクスメトミジン	デクスメトミジン	デクスメトミジン	デクスメトミジン	デクスメトミジン
		ノルアド・ビトレシン	ノルアド・ビトレシン	ノルアド・ビトレシン	ノルアド・ビトレシン	ノルアド・ビトレシン	ノルアド・ビトレシン
		症象、鎮静	症象、鎮静	症象、鎮静	症象、鎮静	症象、鎮静	症象、鎮静
		一般採血	一般採血	一般採血	一般採血	一般採血	一般採血
		血液ガス	血液ガス	血液ガス	血液ガス	血液ガス	血液ガス
		胸部レントゲン	胸部レントゲン	胸部レントゲン	胸部レントゲン	胸部レントゲン	胸部レントゲン
		胸部ポータブル	胸部ポータブル	胸部ポータブル	胸部ポータブル	胸部ポータブル	胸部ポータブル
		腹部レントゲン	腹部レントゲン	腹部レントゲン	腹部レントゲン	腹部レントゲン	腹部レントゲン
		腹部ポータブル	腹部ポータブル	腹部ポータブル	腹部ポータブル	腹部ポータブル	腹部ポータブル
		血培2セット	血培2セット	血培2セット	血培2セット	血培2セット	血培2セット
		尿培	尿培	尿培	尿培	尿培	尿培
		高血糖時 インスリン	高血糖時 インスリン	高血糖時 インスリン	高血糖時 インスリン	高血糖時 インスリン	高血糖時 インスリン
		低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示
		プロベト	プロベト	プロベト	プロベト	プロベト	プロベト
		亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏
		ロキソプロフェンテープ	ロキソプロフェンテープ	ロキソプロフェンテープ	ロキソプロフェンテープ	ロキソプロフェンテープ	ロキソプロフェンテープ

第6病日	第7病日	第8病日	第9病日	第10病日(予備日)
6日目	7日目	8日目	9日目	10日目
■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■血尿の増強がない	■血尿の増強がない	
■血尿の増強がない	■血尿の増強がない	■血尿がない	■血尿がない	
■血尿がない	■血尿がない			
■膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している	■膀胱留置カテーテル抜去後排尿障害を起こさない	■膀胱留置カテーテル抜去後排尿障害を起こさない	■膀胱留置カテーテル抜去後排尿障害を起こさない	■膀胱留置カテーテル抜去後排尿障害を起こさない
■尿路感染を起こさない	■尿路感染を起こさない	■尿路感染を起こさない	■尿路感染を起こさない	
■合併症なく過ごすことができる	■合併症なく過ごすことができる	■合併症なく過ごすことができる	■合併症なく過ごすことができる	
■退院後の留意点が理解できる ・新規-評価基準	■退院後の留意点が理解できる ・新規-評価基準	■退院後の留意点が理解できる ・新規-評価基準	■退院後の留意点が理解できる ・新規-評価基準	
■退院に対して不安がない ・新規-評価基準	■退院に対して不安がない ・新規-評価基準	■退院に対して不安がない ・新規-評価基準	■退院に対して不安がない ・新規-評価基準	
		■日常生活の注意点が実行できる	■日常生活の注意点が実行できる	
■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる	
			■問題なく退院できる	
疼痛(下腹部)	疼痛(下腹部)	疼痛(下腹部)	疼痛(下腹部)	疼痛(下腹部)
血尿(血尿スケール)	血尿(血尿スケール)	血尿(血尿スケール)	血尿(血尿スケール)	血尿(血尿スケール)
尿量	尿量	尿量	尿量	尿量
希望食	希望食	希望食	希望食	希望食
フリー	フリー	フリー	フリー	フリー
シャワー	シャワー	シャワー	シャワー	シャワー
更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備
陰部洗浄	陰部洗浄	陰部洗浄	陰部洗浄	陰部洗浄
 回診時膀胱留置カテーテル抜去 蓄尿有無Drに確認。必	 回診時膀胱留置カテーテル抜去 蓄尿有無Drに確認。必	 バルーン抜去2日経過し 問題なければ退院可能	 バルーン抜去2日経過し 問題なければ退院可能	問題なければ退院可能
	 バルーン抜去2日経過し 問題なければ退院可能			
	 退院指導		 退院時説明	 退院時説明
			 退院証明書	 退院証明書
			 退院時服薬指導	 退院時服薬指導
			 再来予約票	 再来予約票
			 10時退院	 10時退院
 下腹部痛 Ba挿入部違和感 血尿の有無 外尿道口部の出血 Baの閉塞の有無 呼吸器合併症の有無 尿量 睡眠	 下腹部痛 Ba挿入部違和感 血尿の有無 外尿道口部の出血 Baの閉塞の有無 呼吸器合併症の有無 尿量 睡眠	 下腹部痛 Ba挿入部違和感 血尿の有無 外尿道口部の出血 Baの閉塞の有無 呼吸器合併症の有無 尿量 睡眠	 下腹部痛 Ba挿入部違和感 血尿の有無 外尿道口部の出血 Baの閉塞の有無 呼吸器合併症の有無 尿量 睡眠	 下腹部痛 Ba挿入部違和感 血尿の有無 外尿道口部の出血 Baの閉塞の有無 呼吸器合併症の有無 尿量 睡眠

発熱時	発熱時	発熱時	発熱時	発熱時
疼痛時	疼痛時	疼痛時	疼痛時	疼痛時
不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時
不穏時	不穏時	不穏時	不穏時	不穏時
便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時
嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時
輸液	輸液	輸液	輸液	輸液
押水	押水	押水	押水	押水
血尿時	血尿時	血尿時	血尿時	血尿時
カルチコール・GI療法	カルチコール・GI療法	カルチコール・GI療法	カルチコール・GI療法	カルチコール・GI療法
GI持続	GI持続	GI持続	GI持続	GI持続
ニカルジピンIV	ニカルジピンIV	ニカルジピンIV	ニカルジピンIV	ニカルジピンIV
ニカルジピン持続	ニカルジピン持続	ニカルジピン持続	ニカルジピン持続	ニカルジピン持続
フロセミドIV	フロセミドIV	フロセミドIV	フロセミドIV	フロセミドIV
フロセミド持続	フロセミド持続	フロセミド持続	フロセミド持続	フロセミド持続
デクスメドミジン	デクスメドミジン	デクスメドミジン	デクスメドミジン	デクスメドミジン
ノルアド・ビトレシン	ノルアド・ビトレシン	ノルアド・ビトレシン	ノルアド・ビトレシン	ノルアド・ビトレシン
痙攣、鎮静	痙攣、鎮静	痙攣、鎮静	痙攣、鎮静	痙攣、鎮静
一般採血	一般採血	一般採血	一般採血	一般採血
血液ガス	血液ガス	血液ガス	血液ガス	血液ガス
胸部レントゲン	胸部レントゲン	胸部レントゲン	胸部レントゲン	胸部レントゲン
胸部ポータブル	胸部ポータブル	胸部ポータブル	胸部ポータブル	胸部ポータブル
腹部レントゲン	腹部レントゲン	腹部レントゲン	腹部レントゲン	腹部レントゲン
腹部ポータブル	腹部ポータブル	腹部ポータブル	腹部ポータブル	腹部ポータブル
血培2セット	血培2セット	血培2セット	血培2セット	血培2セット
尿培	尿培	尿培	尿培	尿培
高血糖時 インスリン	高血糖時 インスリン	高血糖時 インスリン	高血糖時 インスリン	高血糖時 インスリン
低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示
プロベト	プロベト	プロベト	プロベト	プロベト
垂鉛筆軟膏	垂鉛筆軟膏	垂鉛筆軟膏	垂鉛筆軟膏	垂鉛筆軟膏
ロキソプロフェンテープ	ロキソプロフェンテープ	ロキソプロフェンテープ	ロキソプロフェンテープ	ロキソプロフェンテープ