

ステップ名称		手術前日	手術当日 午前中	手術当日 手術後
		1日目	2日目	
合併症	自覚症状			■苦痛・創部痛のコントロールができる
生活動作	活動			■ADLの拡大に努める
	排便・排尿			■膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している
知識・理解	退院時			
	入院時	■入院環境に慣れ、手術の受け入れができる		
	検査中		■手術がスムーズに行われる	
	検査後			■異常の早期発見と対処ができる
	第n病日			
観察項目		残尿感	排尿障害	残尿感
		排尿障害	残尿感	血尿（血尿スケール）
		血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	疼痛（下腹部）
		尿量	尿量	尿量
検査結果				
食事		 希望食または治療食	 朝食から禁食 飲水は7時まで取れます	
		 21時～絶飲食		
安静度		 フリー	 病棟内フリー OPE室へは独歩可	 ベット上安静
排泄				
清潔		 入浴 爪切り	 更衣 環境整備	 お迎えはオムツLを乗せていく。
検査		 入院後KUB		 結石分析
治療処置				 モニター
				 尿破棄時こし器使用。排石確認。
				 カテーテル血尿確認
				 酸素投与
薬剤		 内服は主治医確認	 必要時常用薬服用 6時前点滴開始 ①ソルアセトF500ml ②ソルアセトF500ml	 持続点滴 ①ソルアセトD500ml (80ml/h) +カルバゾクロム100mg ②ソリターT3、500ml (80ml/h) ③ソルアセトD500ml
		 21時センナリド2T 必要時リスミー1錠	 手術室持参セフメタゾール 1キット	
		 入院時オリエンテーション	 手術必要物品確認 ・手術着 ・Lオムツ 麻酔承諾書回収確認	 Ba留置中の注意点
		 入院診療計画書		
		 麻酔、手術内容説明		

説明・指導		 手術伝票確認		
		 手術必要物品説明		
		 承諾書回収		
		 畜尿方法の説明		
		 麻酔科医より説明（外来で説明がなかった時）		
観察		 排尿障害 残尿感 血尿 尿量 睡眠	⇒ 排尿障害 残尿感 血尿 尿量 睡眠	⇒ 排尿障害 残尿感 血尿 尿量 睡眠
糖尿病				
書類				
手術				
リハビリ				
カルテ				
転倒・転落				
自己管理				
条件付き指示		発熱時	⇒ 発熱時	⇒ 発熱時
		疼痛時	⇒ 疼痛時	⇒ 疼痛時
		不眠時	⇒ 不眠時	⇒ 不眠時
		不穏時	⇒ 不穏時	⇒ 不穏時
		便秘時	⇒ 便秘時	⇒ 便秘時
		嘔気・嘔吐時	⇒ 嘔気・嘔吐時	⇒ 嘔気・嘔吐時
		輸液	⇒ 輸液	⇒ 輸液
		押水	⇒ 押水	⇒ 押水
		血尿時	⇒ 血尿時	⇒ 血尿時
		カルチコール・GI療法	⇒ カルチコール・GI療法	⇒ カルチコール・GI療法
		GI持続	⇒ GI持続	⇒ GI持続
		ニカルジピンIV	⇒ ニカルジピンIV	⇒ ニカルジピンIV
		ニカルジピン持続	⇒ ニカルジピン持続	⇒ ニカルジピン持続
		フロセミドIV	⇒ フロセミドIV	⇒ フロセミドIV
		フロセミド持続	⇒ フロセミド持続	⇒ フロセミド持続
		デクスメデトミジン	⇒ デクスメデトミジン	⇒ デクスメデトミジン
		ノルアド・ビトレシン	⇒ ノルアド・ビトレシン	⇒ ノルアド・ビトレシン
		痙攣、鎮静	⇒ 痙攣、鎮静	⇒ 痙攣、鎮静
		一般採血	⇒ 一般採血	⇒ 一般採血
		血液ガス	⇒ 血液ガス	⇒ 血液ガス
		胸部レントゲン	⇒ 胸部レントゲン	⇒ 胸部レントゲン
		胸部ポータブル	⇒ 胸部ポータブル	⇒ 胸部ポータブル
		腹部レントゲン	⇒ 腹部レントゲン	⇒ 腹部レントゲン
		腹部ポータブル	⇒ 腹部ポータブル	⇒ 腹部ポータブル
		血培2セット	⇒ 血培2セット	⇒ 血培2セット
		尿培	⇒ 尿培	⇒ 尿培
		高血糖時 インスリン	⇒ 高血糖時 インスリン	⇒ 高血糖時 インスリン
		低血糖指示	⇒ 低血糖指示	⇒ 低血糖指示
		プロベト	⇒ プロベト	⇒ プロベト
		亜鉛華軟膏	⇒ 亜鉛華軟膏	⇒ 亜鉛華軟膏
		ロキソプロフェンテープ	⇒ ロキソプロフェンテープ	⇒ ロキソプロフェンテープ

第1病日	第2病日	第4病日 予備日	第3病日 退院
3日目	4日目	5日目	6日目
■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる		
■ADLの拡大に努める	■ADLの拡大に努める		
■膀胱留置カテーテル抜去後排尿障害を起こさない	■膀胱留置カテーテル抜去後排尿障害を起こさない	■膀胱留置カテーテル抜去後排尿障害を起こさない	■膀胱留置カテーテル抜去後排尿障害を起こさない
			■退院が可能な状態であることを、本人・家族が理解している ・新規-評価基準
			■退院後の留意点が理解できる ・新規-評価基準
			■退院に対して不安がない ・新規-評価基準
■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる		
			■問題なく退院できる
疼痛（下腹部）	疼痛（下腹部）	疼痛（下腹部）	疼痛（下腹部）
血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）
尿量	尿量	尿量	尿量
	 希望食	 希望食	 希望食
 フリー	 フリー	 フリー	 フリー
		 フリー	
 シャワー可			
 モニター			
 弾性ストッキングoff			
 朝回診後Drに確認し看護師で膀胱留置カテーテル抜去後、尿コ			
 カテーテル血尿確認			
 朝～常用薬服用			
	 服薬指導	 退院時説明	 退院時説明
		 退院証明書	 退院証明書
		 退院時服薬指導	 退院時服薬指導

		 再来予約票	 再来予約票
		 10時退院	 10時退院
 排尿障害 残尿感 血尿 尿量 睡眠	 排尿障害 残尿感 血尿 尿量 睡眠	 排尿障害 残尿感 血尿 尿量 睡眠	 排尿障害 残尿感 血尿 尿量 睡眠
		 疼痛 血尿の有無 排石の有無	
 発熱時	 発熱時	 発熱時	 発熱時
 疼痛時	 疼痛時	 疼痛時	 疼痛時
 不眠時	 不眠時	 不眠時	 不眠時
 不穏時	 不穏時	 不穏時	 不穏時
 便秘時	 便秘時	 便秘時	 便秘時
 嘔気・嘔吐時	 嘔気・嘔吐時	 嘔気・嘔吐時	 嘔気・嘔吐時
 輸液	 輸液	 輸液	 輸液
 押水	 押水	 押水	 押水
 血尿時	 血尿時	 血尿時	 血尿時
 カルチコール・GI療法	 カルチコール・GI療法	 カルチコール・GI療法	 カルチコール・GI療法
 GI持続	 GI持続	 GI持続	 GI持続
 ニカルジピンIV	 ニカルジピンIV	 ニカルジピンIV	 ニカルジピンIV
 ニカルジピン持続	 ニカルジピン持続	 ニカルジピン持続	 ニカルジピン持続
 フロセミドIV	 フロセミドIV	 フロセミドIV	 フロセミドIV
 フロセミド持続	 フロセミド持続	 フロセミド持続	 フロセミド持続
 デクスメデトミジン	 デクスメデトミジン	 デクスメデトミジン	 デクスメデトミジン
 ノルアド・ピトレシン	 ノルアド・ピトレシン	 ノルアド・ピトレシン	 ノルアド・ピトレシン
 痙攣・鎮静	 痙攣・鎮静	 痙攣・鎮静	 痙攣・鎮静
 一般採血	 一般採血	 一般採血	 一般採血
 血液ガス	 血液ガス	 血液ガス	 血液ガス
 胸部レントゲン	 胸部レントゲン	 胸部レントゲン	 胸部レントゲン
 胸部ポータブル	 胸部ポータブル	 胸部ポータブル	 胸部ポータブル
 腹部レントゲン	 腹部レントゲン	 腹部レントゲン	 腹部レントゲン
 腹部ポータブル	 腹部ポータブル	 腹部ポータブル	 腹部ポータブル
 血培2セット	 血培2セット	 血培2セット	 血培2セット
 尿培	 尿培	 尿培	 尿培
 高血糖時 インスリン	 高血糖時 インスリン	 高血糖時 インスリン	 高血糖時 インスリン
 低血糖指示	 低血糖指示	 低血糖指示	 低血糖指示
 プロペト	 プロペト	 プロペト	 プロペト
 亜鉛華軟膏	 亜鉛華軟膏	 亜鉛華軟膏	 亜鉛華軟膏
 ロキソプロフェンテープ	 ロキソプロフェンテープ	 ロキソプロフェンテープ	 ロキソプロフェンテープ