

ステップ名称		1日目 前日	2日目 当日	3日目 術後1日目	4日目 術後2日目	5日目 術後3日目
		1日目	2日目	3日目	4日目	5日目
			術前	術後		
合併症	自覚症状		■血尿の増強がない	■血尿の増強がない	■血尿の増強がない	■血尿の増強がない
	客観的観察		■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる
生活動作	活動		■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない
	排便・排尿		■指示された安静が守られている	■ADLの拡大に努める		
知識・理解	術後		■ADLの拡大に努める			
	退院時		■尿管カテーテルの違和感が自製内である・新規・評価基準	■尿管カテーテルの違和感が自製内である・新規・評価基準	■膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している	■膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している
	検査前日	■手術の準備ができる		■合併症なく過ごすことができる	■合併症なく過ごすことができる	■合併症なく過ごすことができる
	検査後		■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる
観察項目	睡眠	睡眠	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）
	尿失禁	尿失禁	睡眠	睡眠	睡眠	睡眠
	排尿障害	排尿障害	排尿障害	排尿障害	排尿障害	排尿障害
	疼痛	疼痛	疼痛	疼痛	疼痛	疼痛
	嘔気	嘔気	嘔気	嘔気	嘔気	嘔気
	出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）
検査結果						
検査	内視鏡					
	血液検査	採血		採血 術後	採血 術後1日目	
	放射線		OPE室で術後胸部部ポートブルXP	レントゲン胸部部（レントゲン室）		
	生理検査		前立腺全摘術 病理			
処方	血管造影					
				セレコキシブ	セレコキシブ	セレコキシブ
処置	看護	入院時膀胱留置をお願いします。（剃毛は不要）	搬入時はオムツ装着	カテーテル内血尿確認	尿道・ドレーンは6時で締めて熱型表とカルテに色と性状を記入して	尿道・ドレーンは6時で締めて熱型表とカルテに色と性状を記入して
	透析	入院時排尿ケア依頼してください	退きのベッドにはLのオムツを装着してください	酸素投与	カテーテル内血尿確認	カテーテル内血尿確認
				ドレーン確認	ドレーン確認	ドレーン確認
注射			OPE前ソラセフトF500を1本80ml/HでルートキープレセファソリンNa 1g+NS2ポート100mlをOPE室持ち込み。	OPE後ソラセフトF500+カルバゾク ロムスルホン酸Na静注 100mg20mLを80ml/H、ソリターT3号G輸液 500mL、ソラセフトF500ml投与。アセリオ1000mg×3（術後）	YDソリターT3号G輸液 500mL+カルバゾク ロムスルホン酸Na静注100mg20mLを40ml/H、ソリターT3号G輸液 500mL40mL/Hで投与。アセリオ1000mg×4（術後）	食事5割食べていれば点滴終了。*食べてなければ主治医に確認をお願いします。
	食事	夕食は食べて良い。	禁飲食。	禁飲食。水分摂取は翌朝から。内服は翌日		
安静度		フリー		9:00 ~ 安静度フリー。歩行不安定時は看護師付きそいで。リハビリ評価		
清潔		シャワー浴可			本人希望あればシャワー浴可（ただし）	本人希望あればシャワー浴可（ただし）
指導	医師					
	看護	【リハビリ】骨盤底筋体操パンフレット渡す		術後は坐業、洗腸・排便も含めて、直腸操作は禁忌。内服で便秘が解消しない場合は主治医に相談。	術後は坐業、洗腸は禁忌です。排便も含めて、直腸操作も禁忌	術後は坐業、洗腸は禁忌です。排便も含めて、直腸操作も禁忌
	栄養指導					
	服薬指導	内服全て続行。OPE当日の内服も続行だが抗血栓薬は確認してください。夕食時糖尿病薬SKIPしてください。糖尿病の人は血糖測定入院時セノシド21内服	排便ないときはグリセリン浣腸施行（6:00）		内服再開	内服はOPE後二日目から再開。
看護問題						
観察項目		血尿 残尿感 排尿時痛	血尿 残尿感 排尿時痛	血尿 残尿感 排尿時痛	血尿 残尿感 排尿時痛	血尿 残尿感 排尿時痛
			膀胱留置カテーテル挿入中 ドレーン排液性状	膀胱留置カテーテル挿入中 ドレーン排液性状	膀胱留置カテーテル挿入中 ドレーン排液性状	膀胱留置カテーテル挿入中 ドレーン排液性状
確認項目		手術同意書 麻酔同意書 DVT同意書 入院診療計画書 輸血同意書 輸血オーダーの確認 RH依頼。	輸血（T & S）OPE中に投与する可能性あり			
リハビリ			RH依頼。			
退院調整						
カルテ						

案件付き指示	発熱時	発熱時	発熱時	発熱時	発熱時	発熱時
	疼痛時	疼痛時	疼痛時	疼痛時	疼痛時	疼痛時
	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時
	不穏時	不穏時	不穏時	不穏時	不穏時	不穏時
	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時
	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時
	輸液	輸液	輸液	輸液	輸液	輸液
	押水	押水	押水	押水	押水	押水
	血尿時	血尿時	血尿時	血尿時	血尿時	血尿時
	カルチコール・GI療法	カルチコール・GI療法	カルチコール・GI療法	カルチコール・GI療法	カルチコール・GI療法	カルチコール・GI療法
	GI持続	GI持続	GI持続	GI持続	GI持続	GI持続
	ニカルジピンIV	ニカルジピンIV	ニカルジピンIV	ニカルジピンIV	ニカルジピンIV	ニカルジピンIV
	ニカルジピン持続	ニカルジピン持続	ニカルジピン持続	ニカルジピン持続	ニカルジピン持続	ニカルジピン持続
	フロセミドIV	フロセミドIV	フロセミドIV	フロセミドIV	フロセミドIV	フロセミドIV
	フロセミド持続	フロセミド持続	フロセミド持続	フロセミド持続	フロセミド持続	フロセミド持続
	デクスメデトミジン	デクスメデトミジン	デクスメデトミジン	デクスメデトミジン	デクスメデトミジン	デクスメデトミジン
	ノルアド・ビトレシン	ノルアド・ビトレシン	ノルアド・ビトレシン	ノルアド・ビトレシン	ノルアド・ビトレシン	ノルアド・ビトレシン
	痙攣、鎮静	痙攣、鎮静	痙攣、鎮静	痙攣、鎮静	痙攣、鎮静	痙攣、鎮静
	一般採血	一般採血	一般採血	一般採血	一般採血	一般採血
	血液ガス	血液ガス	血液ガス	血液ガス	血液ガス	血液ガス
	胸部レントゲン	胸部レントゲン	胸部レントゲン	胸部レントゲン	胸部レントゲン	胸部レントゲン
	胸部ポータブル	胸部ポータブル	胸部ポータブル	胸部ポータブル	胸部ポータブル	胸部ポータブル
	腹部レントゲン	腹部レントゲン	腹部レントゲン	腹部レントゲン	腹部レントゲン	腹部レントゲン
	腹部ポータブル	腹部ポータブル	腹部ポータブル	腹部ポータブル	腹部ポータブル	腹部ポータブル
	血糖2セット	血糖2セット	血糖2セット	血糖2セット	血糖2セット	血糖2セット
	尿培	尿培	尿培	尿培	尿培	尿培
	高血糖時 インスリン	高血糖時 インスリン	高血糖時 インスリン	高血糖時 インスリン	高血糖時 インスリン	高血糖時 インスリン
	低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示
	プロベト	プロベト	プロベト	プロベト	プロベト	プロベト
	亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏
	ロキソプロフェンテープ	ロキソプロフェンテープ	ロキソプロフェンテープ	ロキソプロフェンテープ	ロキソプロフェンテープ	ロキソプロフェンテープ
	尿道カテ	尿道カテ	尿道カテ	尿道カテ	尿道カテ	尿道カテ
	創処置	創処置	創処置	創処置	創処置	創処置
	酸素	酸素	酸素	酸素	酸素	酸素
	ドレーン	ドレーン	ドレーン	ドレーン	ドレーン	ドレーン

6日目 術後4日目	7日目 術後5日目	8日目 術後6日目	9日目 術後7日目	10日目 術後8日目	11日目 術後9日目
6日目	7日目	8日目	9日目	10日目	11日目
■血尿の増強がない	■血尿の増強がない	■血尿の増強がない	■血尿の増強がない	■血尿の増強がない	
■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	
■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない	
■膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している	■膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している	■膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している	■膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している	■失禁が少なくなり、排尿間隔を保つことができる	
		■膀胱留置カテーテル抜去後排尿障害を起こさない	■失禁が少なくなり、排尿間隔を保つことができる		
■合併症なく過ごすことができる	■合併症なく過ごすことができる	■合併症なく過ごすことができる	■合併症なく過ごすことができる	■合併症なく過ごすことができる	
	■退院後の留意点が理解できる・新規-評価基準	■退院後の留意点が理解できる・新規-評価基準	■退院後の留意点が理解できる・新規-評価基準	■退院後の留意点が理解できる・新規-評価基準	
	■退院に対して不安がない・新規-評価基準	■退院に対して不安がない・新規-評価基準	■退院に対して不安がない・新規-評価基準	■退院に対して不安がない・新規-評価基準	
■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる
血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）
睡眠	睡眠	睡眠	睡眠	睡眠	睡眠
排尿障害	排尿障害	排尿障害	排尿障害	排尿障害	排尿障害
疼痛	疼痛	疼痛	疼痛	疼痛	疼痛
嘔気	嘔気	嘔気	嘔気	嘔気	嘔気
出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）
→ セレコキシブ →	→ セレコキシブ →	→ セレコキシブ →	→ セレコキシブ →		
→ カロナール →	→ カロナール →	→ カロナール →	→ カロナール →		
→ 酸化Mg毎食後、下痢あれば、適宜減量中止可 尿・ドレインは6時で締めて熱型表とカルテに色と性状を記入して カテーテル内血尿確認 →	→ 酸化Mg毎食後、下痢あれば、適宜減量中止可 尿・ドレインは6時で締めて熱型表とカルテに色と性状を記入して カテーテル内血尿確認 →	→ 酸化Mg毎食後、下痢あれば、適宜減量中止可 尿・ドレインは6時で締めて熱型表とカルテに色と性状を記入して カテーテル内血尿確認 →	→ 尿・ドレインは6時で締めて熱型表とカルテに色と性状を記入して →		
		→ パーミロール貼り替え →			
→ 本人希望あればシャワー浴可（た） →	→ 本人希望あればシャワー浴可（た） →	→ 本人希望あればシャワー浴可（た） →	→ 本人希望あればシャワー浴可（た） →	→ 本人希望あればシャワー浴可（た） →	→ 本人希望あればシャワー浴可（た） →
術後は坐業、洗腸は禁忌です。排便も含めて、直腸操作も禁忌	術後は坐業、洗腸は禁忌です。排便も含めて、直腸操作も禁忌	尿力予抜去予定。先生が抜きます。抜去後翌日もしくは、翌々日に退院予定 術後は坐業、洗腸は禁忌です。排便も含めて、直腸操作も禁忌	退院予定。 術後は坐業、洗腸は禁忌です。排便も含めて、直腸操作も禁忌	退院予定。 術後は坐業、洗腸は禁忌です。排便も含めて、直腸操作も禁忌	退院予定。 術後は坐業、洗腸は禁忌です。排便も含めて、直腸操作も禁忌
		Ba抜去後の生活指導（指導していません） 【リハビリ】 骨盤底筋体操指導		次回診・退院処方確認	次回診・退院処方確認
→ 血尿 残尿感 排尿時痛 →	→ 血尿 残尿感 排尿時痛 →	→ 血尿 残尿感 排尿時痛 →	→ 血尿 残尿感 排尿時痛 →	→ 血尿 残尿感 排尿時痛 →	→ 血尿 残尿感 排尿時痛 →
→ 膀胱留置カテーテル挿入中 ドレイン排液性状 →	→ 膀胱留置カテーテル挿入中 ドレイン排液性状 →	→ 膀胱留置カテーテル挿入中 ドレイン排液性状 →	→ 膀胱留置カテーテル挿入中 ドレイン排液性状 →	→ 膀胱留置カテーテル挿入中 ドレイン排液性状 →	→ 膀胱留置カテーテル挿入中 ドレイン排液性状 →

発熱時	発熱時	発熱時	発熱時	発熱時	発熱時
疼痛時	疼痛時	疼痛時	疼痛時	疼痛時	疼痛時
不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時
不穏時	不穏時	不穏時	不穏時	不穏時	不穏時
便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時
嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時
輸液	輸液	輸液	輸液	輸液	輸液
押水	押水	押水	押水	押水	押水
血尿時	血尿時	血尿時	血尿時	血尿時	血尿時
カルチコール・GI療法	カルチコール・GI療法	カルチコール・GI療法	カルチコール・GI療法	カルチコール・GI療法	カルチコール・GI療法
GI持続	GI持続	GI持続	GI持続	GI持続	GI持続
ニカルジピンIV	ニカルジピンIV	ニカルジピンIV	ニカルジピンIV	ニカルジピンIV	ニカルジピンIV
ニカルジピン持続	ニカルジピン持続	ニカルジピン持続	ニカルジピン持続	ニカルジピン持続	ニカルジピン持続
フロセミドIV	フロセミドIV	フロセミドIV	フロセミドIV	フロセミドIV	フロセミドIV
フロセミド持続	フロセミド持続	フロセミド持続	フロセミド持続	フロセミド持続	フロセミド持続
デクスメデトミジン	デクスメデトミジン	デクスメデトミジン	デクスメデトミジン	デクスメデトミジン	デクスメデトミジン
ノルアド・ビトレシン	ノルアド・ビトレシン	ノルアド・ビトレシン	ノルアド・ビトレシン	ノルアド・ビトレシン	ノルアド・ビトレシン
痙攣、鎮静	痙攣、鎮静	痙攣、鎮静	痙攣、鎮静	痙攣、鎮静	痙攣、鎮静
一般採血	一般採血	一般採血	一般採血	一般採血	一般採血
血液ガス	血液ガス	血液ガス	血液ガス	血液ガス	血液ガス
胸部レントゲン	胸部レントゲン	胸部レントゲン	胸部レントゲン	胸部レントゲン	胸部レントゲン
胸部ポータブル	胸部ポータブル	胸部ポータブル	胸部ポータブル	胸部ポータブル	胸部ポータブル
腹部レントゲン	腹部レントゲン	腹部レントゲン	腹部レントゲン	腹部レントゲン	腹部レントゲン
腹部ポータブル	腹部ポータブル	腹部ポータブル	腹部ポータブル	腹部ポータブル	腹部ポータブル
血塘2セット	血塘2セット	血塘2セット	血塘2セット	血塘2セット	血塘2セット
尿塘	尿塘	尿塘	尿塘	尿塘	尿塘
高血糖時 インスリン	高血糖時 インスリン	高血糖時 インスリン	高血糖時 インスリン	高血糖時 インスリン	高血糖時 インスリン
低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示
フロベト	フロベト	フロベト	フロベト	フロベト	フロベト
垂鉛華軟膏	垂鉛華軟膏	垂鉛華軟膏	垂鉛華軟膏	垂鉛華軟膏	垂鉛華軟膏
ロキソプロフェンテープ	ロキソプロフェンテープ	ロキソプロフェンテープ	ロキソプロフェンテープ	ロキソプロフェンテープ	ロキソプロフェンテープ
尿道カテ	尿道カテ	尿道カテ	尿道カテ	尿道カテ	尿道カテ
創処置	創処置	創処置	創処置	創処置	創処置
酸素	酸素	酸素	酸素	酸素	酸素
ドレーン	ドレーン	ドレーン	ドレーン	ドレーン	ドレーン