

ステップ名称		入院日 化学療法当日	入院2日目
		1日目	2日目
患者状態	症状	■ 悪心・嘔吐がない ・新規-評価基準	
知識・理解	外来にて	■ 治療に対する受け入れが出来る	
	退院時	■ 退院後の留意点が理解できる ・新規-評価基準	■ 退院後の留意点が理解できる ・新規-評価基準
			■ 退院に対して不安がない ・新規-評価基準
			■ 日常生活の留意点が実行できる
	入院時	■ 本人及び家族が治療計画を理解している ・新規-評価基準	
第n病日		■ 問題なく退院できる	
観察項目		嘔気	嘔気
		嘔吐	嘔吐
		食欲	食欲
		不安	不安
		腫脹	
検査結果			
食事	 普通食	 普通食	
安静度	 病棟内フリー	 病棟内フリー	
排泄			
清潔	 化学療法終了後、シャワー・入浴可		
検査			
治療処置			
薬剤	 薬剤師から服薬指導		
説明・指導	 西口CNからの退院指導		
観察			
糖尿病			
書類			
手術			
リハビリ			
カルテ			
転倒・転落		 嘔気・嘔吐 食欲 点滴漏れの有無 化学療法投与時、有害事象の有	➡ 嘔気・嘔吐 食欲 点滴漏れの有無 化学療法投与時、有害事象の有
			 嘔気・嘔吐 食欲 点滴漏れの有無 化学療法投与時、有害事象の有

自己管理		 入院診療計画書作成	 化学療法後の療養生活について
		 化学療法承諾書	
		 化学療法中、心電図モニター装着 終了後OFF	
		 バイタルサイン 化学療法投与時 5分 15分 ( テンプレート使用)	
		 外来にてライン確保 (20~ 22G)	
		 化学療法を受ける患者さまへの パンフレットを使用し説明 (外来	
		 入院時オリエンテーション (外来 化学療法室からのオリエンテー	
条件付き指示		 血圧 160/mmHg 以上 アムロジピン 5mg 1錠	 血圧 160/mmHg 以上 アムロジピン 5mg 1錠
		 疼痛時 ①カロナール200mg 2 錠 ②アセリオ静注液 1000mg100m L 1袋 ③アデフロニックズポ50 50mg	 疼痛時 ①カロナール200mg 2 錠 ②アセリオ静注液 1000mg100m L 1袋 ③アデフロニックズポ50 50mg
		 発熱時 (38度以上) ①カロ ナー ル200mg 2錠 ②アデフロニックズポ50 50mg	 発熱時 (38度以上) ①カロ ナー ル200mg 2錠 ②アデフロニックズポ50 50mg
		 不眠時 ①デエビゴ錠5mg 1錠 ②ラメルテオン錠8mg 1錠	 不眠時 ①デエビゴ錠5mg 1錠 ②ラメルテオン錠8mg 1錠
		 不穏時 ①セレネース錠0.75mg 1錠 ②リスペリドン内用液 1mg	 不穏時 ①セレネース錠0.75mg 1錠 ②リスペリドン内用液 1mg