

ステップ名称		①入院1日目	②入院2日目 OPE当日
		1日目	2日目
患者状態	バイタル	■循環動態が安定している ・ SpO2 95%＜適正值 ・ Na 150＞ 適正值	■循環動態が安定している ・ SpO2 95%＜適正值 ・ Na 150＞ 適正值
	術前	■不安の内容を表出できる	■不安の内容を表出できる
知識・理解	退院時		■退院後の留意点が理解できる ・ 新規-評価基準
			■退院に対して不安がない ・ 新規-評価基準
	検査前日	■検査の準備が出来る	■検査の準備が出来る
	入院時	■入院について理解している ・ 新規-評価基準	■入院について理解している ・ 新規-評価基準
	検査前	■検査に対する不安を軽減できる	■検査に対する不安を軽減できる
■検査の内容・目的が理解でき、スムーズに検査が受けられる		■検査の内容・目的が理解でき、スムーズに検査が受けられる	
観察項目		胸部不快	嘔気
		睡眠	胸部不快
		不安	嘔吐
			睡眠
			腫脹（穿刺部）
			不安
			出血（穿刺部）
			疼痛
			シャント音
			心電図モニター波形
検査結果			
検査	内視鏡		
	血液検査	 採血	 採血
	放射線		 手術
	生理検査	 心電図	 術中にTEE（同意書必須） 術後、1時間後にTTE
			 心電図
	血管造影		
処方		 朝分内服は6：00までに実施	
処置	看護		
	透析	 透析患者の点滴の内容を主治医に確認	 透析患者の点滴の内容を主治医に確認
注射			
			
食事		 夕 入院予約	

安静度			
			術後プロトコルあり
			
清潔			
			
指導	医師	 入院時指示	 入院時指示
			 入院時指示
	看護		
	栄養指導		
	服薬指導		
看護問題			
			
観察項目			
確認項目		 持参薬内容確認	 持参薬内容確認
リハビリ		 リハビリオーダーは必要時に依頼	 リハビリオーダーは必要時に依頼
退院調整			
カルテ		 書類関係	 書類関係
			
		 311	 311
		DOA	DOA
		DOB	DOB
		NAD通常量	NAD通常量
		NAD5倍量	NAD5倍量
		ピトレシン	ピトレシン
		ボスミン	ボスミン
		ハンプ	ハンプ
		ミルリノン	ミルリノン
		サムタス	サムタス
		ダイアモックス	ダイアモックス
		フロセミド持続	フロセミド持続
		フロセミド静注	フロセミド静注
		エポプロ	エポプロ
		コアテック	コアテック
		ニカルジピンハーフ	ニカルジピンハーフ
		ニコランジル	ニコランジル
		ニトログリセリン	ニトログリセリン
		アルガトロバン	アルガトロバン

ヘパリン2V+NS10ml	ヘパリン2V+NS10ml
ヘパリン2V+NS40ml	ヘパリン2V+NS40ml
ナファモスタット	ナファモスタット
2倍ナファモスタット	2倍ナファモスタット
ATIII (ノンスロン)	ATIII (ノンスロン)
リコモジュリン	リコモジュリン
生食	生食
ヘパロック 10ml	ヘパロック 10ml
ヘパロック5ml	ヘパロック5ml
Aライン	Aライン
Aラインアルガトロバン	Aラインアルガトロバン
パージ液	パージ液
パージ液半分	パージ液半分
ビタミンK	ビタミンK
プロタミン5ml	プロタミン5ml
プロタミン10ml	プロタミン10ml
アドナ・トランサミン	アドナ・トランサミン
プリズバインド	プリズバインド
ケイセントラ (-49kg)	ケイセントラ (-49kg)
ケイセントラ (50-69kg)	ケイセントラ (50-69kg)
ケイセントラ (70-89kg)	ケイセントラ (70-89kg)
3 %NaCl	3 %NaCl
GI療法500ml	GI療法500ml
KCLハーフ	KCLハーフ
KCL末梢補正 (glu)	KCL末梢補正 (glu)
KCL末梢補正 (NS)	KCL末梢補正 (NS)
マグネシウム	マグネシウム
低リン血症	低リン血症
ケイキサレート注腸	ケイキサレート注腸
5%ブドウ糖液250ml	5%ブドウ糖液250ml
5%ブドウ糖液500ml	5%ブドウ糖液500ml
アルブミン50ml	アルブミン50ml
アルブミン250ml	アルブミン250ml
生食100ml	生食100ml
生食500ml	生食500ml
生食1000ml	生食1000ml
ソルアセト	ソルアセト
ソルデム1	ソルデム1
ソリタT3	ソリタT3
パレプラス	パレプラス
ビーフリード	ビーフリード
ビカネイト	ビカネイト
ボルベン	ボルベン
腎不全TPN	腎不全TPN
ATP	ATP
アミオダロン①	アミオダロン①
アミオダロン②	アミオダロン②
アミオダロン③	アミオダロン③
オノアクト	オノアクト
サンリズム点滴	サンリズム点滴

条件付き指示

ジルチアゼム点滴	ジルチアゼム点滴
シンビット単回	シンビット単回
ワソラン	ワソラン
イソプロ	イソプロ
サンリズム	サンリズム
ジルチアゼム	ジルチアゼム
タンボコール	タンボコール
ビスノ2mg	ビスノ2mg
ビスノ4mg	ビスノ4mg
ワソラン	ワソラン
ライゾデグ	ライゾデグ
アピドラ	アピドラ
ノボラピッド30ミックス	ノボラピッド30ミックス
グラルギン	グラルギン
ノボラピッド	ノボラピッド
ヒューマリン持続	ヒューマリン持続
50%ブドウ糖液20ml	50%ブドウ糖液20ml
50%ブドウ糖液40ml	50%ブドウ糖液40ml
イソプロ・プロポフォル	イソプロ・プロポフォル
ネブライザー	ネブライザー
フルティフォーム	フルティフォーム
体幹：アンテベート・ヘパリン混合	体幹：アンテベート・ヘパリン混合
体幹：アンテベート10本	体幹：アンテベート10本
体幹：デルモベート+ヘパリン	体幹：デルモベート+ヘパリン
顔：ロコイドクリーム	顔：ロコイドクリーム
ゲンタシン10g	ゲンタシン10g
ゲンタシン100g	ゲンタシン100g
亜鉛軟膏	亜鉛軟膏
イソジンゲル	イソジンゲル
ゲーベン	ゲーベン
プロベト	プロベト
メイスパン軟膏	メイスパン軟膏
レスタミン	レスタミン
胸部座位P	胸部座位P
胸部臥位P	胸部臥位P
胸部カテ挿入後	胸部カテ挿入後
胸部胃管確認	
腹部P	
腹部カテ確認	
心電図ポータブル	
APTT/PT	
ICUMIフォロー	
MI採血フォロー3回	
急変時セット	
血液ガス	
血液培養動脈	
血液培養静脈	
痰培養	
尿培養	
便培養	

	アセリオ500mg	
	アセリオ1000mg	
	カロナール500mg	
	ソセゴン15mg	
	トアラセット	
	ジクロフェナク25mg	
	ロキソニン	
	ロキソニンテープ	
	メトクロプラミド	
	ディプリバン	
	倍量デクスメトミジン	
	デクスメトミジン	
	プロポフォール	
	ミタゾラム	
	ロクロニウム	
	グリセリン浣腸30ml	
	グリセリン浣腸60ml	
	センノシド	
	パントシン	
	ピコスルファート	
	ブスコパン	
	レシカルボン	
	グラマリール	
	サイレース内服	
	セレネース点滴	
	ゾルピデム	
	デエビゴ	
	プロチゾラム	
	リスパダール	
	レスリン	
	薬疹処方	
	越婢加朮湯	
	造影1時間前セット	
	ソル・メドロール125	
	ルパフィン	
	ビラノア	
	頭部MRI/A	
	頭部CT	
	胸腹部CT	
	急変時採血X-ray	
	アドレナリン	
	ボスミン	
	アトロピン	
	アトロピンシリンジ	
	ボルベン	