ステップ名称		手術前日	手術当日 手術前	手術当日 手術後	術後1日目	術後2日目	術後3日目	術後4日目	術後5日目
		1日目	2日目		3日目	4日目	5日目	6日目	7日目
合併症	自覚症状	■苦痛・創部痛のコントロールができる		■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる
	客観的観察	■創部の出血がない		■創部の出血がない	■創部の出血がない	■創部の出血がない	■創部の出血がない	■創部の出血がない	■創部の出血がない
		■創部の発赤・腫脹がない		■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない
		■術後神経障害がない		■術後神経障害がない	■術後神経障害がない	■術後神経障害がない	■術後神経障害がない	■術後神経障害がない	■術後神経障害がない
生活動作	活動	■シャワー浴ができる							
	経口	■水分摂取が問題なくできる							
知識・理解	術前		■手術前の絶飲食が守れる						
			■手術に対する不安を軽減できる						
	検査前日	■手術の準備ができる							
	入院時	■本人及び家族が治療計画を理解している ・新規-評価基準							
		■絶飲食について理解している							
観察項目		疼痛 しびれ 可動性（足趾） 熱感 腫脹 動脈触知（左足背動脈） 動脈触知（右足背動脈） 睡眠	疼痛 しびれ 可動性（足趾） 熱感 腫脹 動脈触知（左足背動脈） 動脈触知（右足背動脈） 睡眠	睡眠 疼痛 腫脹 熱感 出血（創部） 心電図モニター波形 呼吸困難感	睡眠 疼痛（創部） 疼痛 熱感 腫脹 可動性（足趾） しびれ 動脈触知（左足背動脈） 出血（創部） 動脈触知（右足背動脈） 心電図モニター波形 呼吸困難感	疼痛（創部） 熱感 腫脹 可動性（足趾） 動脈触知（左足背動脈） 動脈触知（右足背動脈） 睡眠 しびれ	疼痛（創部） 熱感 腫脹 可動性（足趾） 動脈触知（左足背動脈） 動脈触知（右足背動脈） 睡眠 しびれ	疼痛（創部） 熱感 腫脹 可動性（足趾） 動脈触知（左足背動脈） 動脈触知（右足背動脈） 睡眠 しびれ	疼痛（創部） 熱感 腫脹 可動性（足趾） 動脈触知（左足背動脈） 動脈触知（右足背動脈） 睡眠 しびれ
検査結果									
食事		21時以降絶食	7時以降絶飲食	絶飲食 ﾍﾞｯﾄ上安静 下肢挙上ｷｬﾌｨｼﾝｸﾞ	食事再開				
安静度					安静度Dr確認				
排泄									
清潔		シャワー浴	清拭後、手術着に更衣		清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア
検査		骨代謝マーカー		OPE後X-P	一般採血（Ca、Pを含む） 骨代謝マーカー			骨密度 椎体X-P	
治療処置		点滴ﾙｰﾄ確保 弾性ストッキング装着 Ba留置		ﾊﾞｲﾀﾙｻｲﾝ測定 心電図ﾓﾆﾀｰ装着開始 指示通りの酸素量投 全身麻酔ｾｯﾄ	ﾊﾞｲﾀﾙｻｲﾝ測定 問題なければ朝に心電図ﾓﾆﾀｰoff 腰麻の場合はマルチOFF Ba抜去（継続の場合Drから指示有り） 術後処置	術後処置	術後処置	術後処置	術後処置
薬剤			降圧剤のみ内服（SKIP出来なさそ OPE点滴（透析、心不全のある方	骨粗鬆症治療歴の確認（持参薬を	内服全て再開 鎮痛薬開始 OPE後点滴	鎮痛薬開始	鎮痛薬開始	鎮痛薬開始	一般採血、骨代謝マーカー、BMD 鎮痛薬開始
説明・指導		術前ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ			禁忌動作 生活指導 栄養評価 問題点の抽出 食事調整 栄養指導計画書の作				
観察		患肢観察 50歳以上に 歯科受診歴の確認	患肢観察	患肢観察	MMSEの実施 患肢観察	患肢観察	患肢観察	患肢観察	FRAX評価 （ワードパレット参照） 患肢観察
糖尿病									
書類		手術同意書の確認、 術前チェックリスト			転倒リスク評価 （テンプレート実施）				
手術									
リハビリ		リハビリオーダー 転倒リスク評価 膝脊神経麻痺の評価							
カルテ		歯科受診歴の有無 カルテ記載			転倒リスク評価 カルテ記載 （テンプレート実				
転倒・転落					転倒リスク評価の実施 （テンプレート実				
自己管理									
条件付き指示									

術後6日目	術後7日目	術後8日目	術後9日目	術後10日目	術後11日目	術後12日目	術後13日目	術後14日目
8日目	9日目	10日目	11日目	12日目	13日目	14日目	15日目	16日目
■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる
■創部の出血がない	■創部の出血がない	■創部の出血がない	■創部の出血がない	■創部の出血がない	■創部の出血がない	■創部の出血がない	■創部の出血がない	■創部の出血がない
■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない
■術後神経障害がない	■術後神経障害がない	■術後神経障害がない	■術後神経障害がない	■術後神経障害がない	■術後神経障害がない	■術後神経障害がない	■術後神経障害がない	■術後神経障害がない
疼痛（創部）	疼痛（創部）	疼痛（創部）	疼痛（創部）	疼痛（創部）	疼痛（創部）	疼痛（創部）	疼痛（創部）	疼痛（創部）
熱感	熱感	熱感	熱感	熱感	熱感	熱感	熱感	熱感
腫脹	腫脹	腫脹	腫脹	腫脹	腫脹	腫脹	腫脹	腫脹
可動性（足趾）	可動性（足趾）	可動性（足趾）	可動性（足趾）	可動性（足趾）	可動性（足趾）	可動性（足趾）	可動性（足趾）	可動性（足趾）
動脈触知（左足背動脈）	動脈触知（左足背動脈）	動脈触知（左足背動脈）	動脈触知（左足背動脈）	動脈触知（左足背動脈）	動脈触知（左足背動脈）	動脈触知（左足背動脈）	動脈触知（左足背動脈）	動脈触知（左足背動脈）
動脈触知（右足背動脈）	動脈触知（右足背動脈）	動脈触知（右足背動脈）	動脈触知（右足背動脈）	動脈触知（右足背動脈）	動脈触知（右足背動脈）	動脈触知（右足背動脈）	動脈触知（右足背動脈）	動脈触知（右足背動脈）
嘔気	嘔気	嘔気	嘔気	嘔気	嘔気	嘔気	嘔気	嘔気
睡眠	睡眠	睡眠	睡眠	睡眠	睡眠	しびれ	しびれ	しびれ
しびれ	しびれ	しびれ	しびれ	しびれ	しびれ			
清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア
				茶テープ変更後シャワー浴確認	茶テープ変更後シャワー浴確認	茶テープ変更後シャワー浴確認	茶テープ変更後シャワー浴確認	茶テープ変更後シャワー浴確認
術後処置	術後処置	術後処置	術後処置	術後処置	術後処置	術後処置	術後処置	術後処置
骨粗鬆症治療薬開始（座位保てな	骨粗鬆症治療薬開始（座位保てな	骨粗鬆症治療薬開始（座位保てな	骨粗鬆症治療薬開始（座位保てな	骨粗鬆症治療薬開始（座位保てな	骨粗鬆症治療薬開始（座位保てな	骨粗鬆症治療薬開始（座位保てな		
鎮痛薬開始	鎮痛薬開始							
骨粗鬆症治療薬の服用意義を説明								
患肢観察	薬剤の副作用	薬剤の副作用	薬剤の副作用	薬剤の副作用	薬剤の副作用	薬剤の副作用	薬剤の副作用	薬剤の副作用
	患肢観察	患肢観察	患肢観察	患肢観察	患肢観察	患肢観察	患肢観察	患肢観察