

ステップ名称		手術前日 入院日	手術当日 手術前	手術当日 手術後	術後1日目 退院可能
		1日目	2日目		3日目
合併症	自覚症状	■苦痛・創部痛のコントロールができる		■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる
	客観的観察	■創部の出血がない		■創部の出血がない	■創部の出血がない
		■創部の発赤・腫脹がない		■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない
				■術後神経障害がない	■術後神経障害がない
患者状態	症状	■疼痛コントロールができています			
知識・理解	術前		■手術前の絶飲食が守れる		
			■手術に対する不安を軽減できる		
	検査前日	■手術の準備ができる			
	入院時	■絶飲食について理解している			
観察項目		睡眠	睡眠	睡眠	睡眠
		疼痛	疼痛	疼痛	疼痛（創部）
		腫脹	腫脹	腫脹	疼痛
		神経麻痺（腓骨神経）	しびれ	しびれ	腫脹
		可動性（足趾）	熱感	熱感	可動性（足趾）
		しびれ		出血（創部）	しびれ
		熱感		心電図モニター波形	動脈触知（左足背動脈）
		動脈触知（左足背動脈）		呼吸困難感	熱感
		動脈触知（右足背動脈）			出血（創部）
					動脈触知（右足背動脈）
					心電図モニター波形
					呼吸困難感
検査結果					
検査	内視鏡				
	血液検査			 OPE後X-P	 術後採血 X-P・CT
	放射線				
	生理検査	 D ₅ イー2以上で下肢エコ			
	血管造影				
処方					 鎮痛剤内服開始
					 退院の場合は抗生剤を主治 医に確認する
処置	看護	 日常生活 ⁷⁷	 日常生活 ⁷⁷	 日常生活 ⁷⁷	 日常生活 ⁷⁷
		 ハ イパシヤ測定 ネー ムバ ント 装着 点滴 ⁸⁷ 確保		 ハ イパシヤ測定 心電図モニター装着開始 指示通りの酸素量投与  全身麻酔セッ	 ハ イパシヤ測定 朝に心電図モニターoff
					 創処置
	透析				
注射			 OPE点滴		 OPE後点滴
食事		 常食（21時以降絶食）	 7時以降絶飲食	 術後3時間後より飲水可、術 後6時 以降は食事可 術後最低3時間は床上排泄、 それ以降は疼痛に応じて可	 食事再開
安静度		 痛みに応じてフリー	 痛みに応じてフリー	 術後3時間後より飲水可、術 後6時 以降は食事可 術後最低3時間は床上排泄、 それ以降は疼痛に応じて可	安静度フリー
					創部の状態次第で退院可能
清潔		 シャワー浴	 清拭	 清拭	 清拭
指導	医師				
	看護	 入院リエンション 術前リエンション			
	栄養指導				
	服薬指導				
看護問題					
観察項目		 患部観察	 患部観察	 患部観察	 患部観察
				 創部観察	 創部観察
確認項目		 お薬手帳と持参薬の受け取りと鑑 別	 降圧剤のみ内服		 内服すべて再開
リハビリ		 OPE前日			
退院調整					
カルテ		 入院申し込み書、保険外給 付サー			
		 ビス利用同意書の説明			
		 入院診療計画書			
		 手術承諾書			
		 麻酔同意書			
		 肺塞栓予防の同意書			
		 保険外給付サービス利用申 し込み の確認・提出			
		入院診療計画書の記入と受け取り			
		保険外給付サービス利用申し込みの 確認			
		問診票の記入・入力			
		 患者本人、家族との初回面 談			
条件付き指示					