

ステップ名称		手術前	入院1日 手術後	術後 1 日目 退院日
		1日目		2日目
合併症	自覚症状		■血尿の増強がない	
			■血尿がない	
知識・理解	術前	■手術前の絶飲食が守れる		
		■術前準備が整っている		
		■手術の心構えができています		
		■予定通り手術を受けることができる		
	術後		■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる
	退院時			■退院が可能な状態であることを、本人・家族が理解している ・新規-評価基準
				■退院後の留意点が理解できる ・新規-評価基準
				■退院に対して不安がない ・新規-評価基準
	入院時	■入院環境に慣れ、検査の受け入れができる		
		■本人及び家族が治療計画を理解している ・新規-評価基準		
■本人及び家族が手術・麻酔について理解している				
第n病日			■問題なく退院できる	
観察項目		血尿（血尿スケール）	自尿	自尿
		残尿感	排尿障害	排尿障害
		排尿障害	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）
		便意	残尿感	残尿感
		不安	疼痛	疼痛
		尿量	尿量	尿量
	検査結果			
食事	 当日の朝食事可 AM10時まで飲水のみ可 禁飲食	 食事、歩行は覚醒次第可能	 常食または治療食	
安静度	 病棟内フリー		 フリー	
排泄	 OPE室入室前に排尿。オペ着に着替え。オムツはつけてもらってください。	 ・排便確認（血便時はDrCall） ・腹満あれば導尿またはBa挿入 ・血尿スケール3以上の時はDrコール	 ・排便確認（血便時はDrCall） ・腹満あれば導尿またはBa挿入 ・血尿スケール3以上の時はDrコール	
清潔			 シャワー可	
検査	 外来検査結果確認	 検体提出確認		
		 腹部エコー 術中		
治療処置	 オペ後ベッドにはLフラットオムツ1枚+酸素マスクを乗せません。	 生検後初回の排尿後ユリリンで確認。導尿して300ml以上の時はDr報告してください。		
		 酸素投与		
薬剤	 ソルアセトF500ml 80m l /h アミカシン 500mg ルート難しければ22GでもOK	 手術後点滴、終了後抜針 ①ソルアセトD500ml+カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg20ml混注 ②ソリタT3 500ml	 抗血栓薬の再開日の確認。今Drは翌日から3日目は中止。4日目に血尿なければ内服可。他Drはいつ再開か確認。	
	 入院時レボフロ500mg内服 →	入院時レボフロ500mg内服		
	 基本薬は全て続行。抗血栓薬については中止になっているか確認してください。			

説明・指導		 外来で手術オリエンテーション（前立腺生検を受けられる患者様へのパンフレット）	 排便時無理な怒責をけない	 排便時無理な怒責をけない		
		 手術伝票確認		 退院証明書		
		 手術後安静の必要性を指導		 服薬指導・生活指導。パンフレットに準じる。		
		 手術承諾書・麻酔同意書回収確認		 10時退院		
		 手術後の必要物品の確認		 血尿、下血、発熱などの症状があったら病院に相談するよう伝える。		
		 入院時オリエンテーション				
		 家族付きそいは不要。ただし、連絡は取れるようにしてください。				
						
観察		 排尿障害 血尿 残尿感 排便 術前の不安 睡眠中	 自尿 排尿障害 血尿 残尿感 血便 疼痛 睡眠中	 自尿 排尿障害 血尿 残尿感 血便 疼痛 睡眠中		
			 KT38.5℃以上の発熱はDrコールしてください。	 KT38.5℃以上の発熱はDrコールしてください。		
糖尿病						
書類		 ・入院診療計画書 ・承諾書 ・麻酔同意書・説明書 ・生検説明書	 術後ENT日と次回診の確認をお願いします。			
手術						
リハビリ						
カルテ						
転倒・転落						
自己管理						
条件付き指示		発熱時	⇒	発熱時	⇒	発熱時
		疼痛時	⇒	疼痛時	⇒	疼痛時
		不眠時	⇒	不眠時	⇒	不眠時
		不穏時	⇒	不穏時	⇒	不穏時
		便秘時	⇒	便秘時	⇒	便秘時
		嘔気・嘔吐時	⇒	嘔気・嘔吐時	⇒	嘔気・嘔吐時
		輸液	⇒	輸液	⇒	輸液
		押水	⇒	押水	⇒	押水
		血尿時	⇒	血尿時	⇒	血尿時
		カルチコール・GI療法	⇒	カルチコール・GI療法	⇒	カルチコール・GI療法
		GI持続	⇒	GI持続	⇒	GI持続
		ニカルジピンIV	⇒	ニカルジピンIV	⇒	ニカルジピンIV
		ニカルジピン持続	⇒	ニカルジピン持続	⇒	ニカルジピン持続
		フロセミドIV	⇒	フロセミドIV	⇒	フロセミドIV
		フロセミド持続	⇒	フロセミド持続	⇒	フロセミド持続
		デクスメドミジン	⇒	デクスメドミジン	⇒	デクスメドミジン
		ノルアド・ビトレシン	⇒	ノルアド・ビトレシン	⇒	ノルアド・ビトレシン
		痙攣、鎮静	⇒	痙攣、鎮静	⇒	痙攣、鎮静
		一般採血	⇒	一般採血	⇒	一般採血
		血液ガス	⇒	血液ガス	⇒	血液ガス
		胸部レントゲン	⇒	胸部レントゲン	⇒	胸部レントゲン
		胸部ポータブル	⇒	胸部ポータブル	⇒	胸部ポータブル
		腹部レントゲン	⇒	腹部レントゲン	⇒	腹部レントゲン
		腹部ポータブル	⇒	腹部ポータブル	⇒	腹部ポータブル
		血培2セット	⇒	血培2セット	⇒	血培2セット
		尿培	⇒	尿培	⇒	尿培
		高血糖時 インスリン	⇒	高血糖時 インスリン	⇒	高血糖時 インスリン
		低血糖指示	⇒	低血糖指示	⇒	低血糖指示
		プロベト	⇒	プロベト	⇒	プロベト
		亜鉛華軟膏	⇒	亜鉛華軟膏	⇒	亜鉛華軟膏
		ロキソプロフェンテープ	⇒	ロキソプロフェンテープ	⇒	ロキソプロフェンテープ
		酸素	⇒	酸素	⇒	酸素
				尿管時 導尿またはバルーン挿入（入りにくければDr依頼）		