

ステップ名称		1日目 前日	2日目 当日	3日目 術後1日目	4日目 術後2日目	5日目 術後3日目
		1日目	2日目	3日目	4日目	5日目
			術前	術後		
合併症	自覚症状		■血尿の増強がない	■血尿の増強がない	■血尿の増強がない	■血尿の増強がない
	客観的観察		■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる
生活動作	活動		■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない
	排便・排尿		■指示された安静が守られている	■ADLの拡大に努める		
			■尿道カテーテルの違和感が自製内である・新尿・評価基準	■尿道カテーテルの違和感が自製内である・新尿・評価基準	■膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している	■膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している
知識・理解	術後			■合併症なく過ごすことができる	■合併症なく過ごすことができる	■合併症なく過ごすことができる
	退院時					
	検査前日	■手術の準備ができる				
	検査後		■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる
観察項目	睡眠	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）
	尿失禁	睡眠	睡眠	睡眠	睡眠	睡眠
	排尿障害	排尿障害	排尿障害	排尿障害	排尿障害	排尿障害
	疼痛	疼痛	疼痛	疼痛	疼痛	疼痛
	嘔気	嘔気	嘔気	嘔気	嘔気	嘔気
	出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）
	ドレーン排液量	ドレーン排液量	ドレーン排液量	ドレーン排液量	ドレーン排液量	ドレーン排液量
検査結果						
検査	内視鏡					
	血液検査	採血	採血 術後	採血 術後1日目		
	放射線		OPF室で術後胸部腹部ポータブルXP	レントゲン胸部腹部（レントゲン室へ）		
	生理検査		前立腺全摘術 病理			
	血管造影					
処方				セレコキシブ	セレコキシブ	セレコキシブ
				カロナール	カロナール	カロナール
処置	看護	入院時換薬をお願ひします。（創形は不要）	搬入時はオムツ装着	カテーテル内血尿確認	尿・ドレーンは6時で締めて熱型表とカルテに色と性状を記入してください。ドレーン様	尿・ドレーンは6時で締めて熱型表とカルテに色と性状を記入してください。ドレーン様
		入院時排尿ケア依頼してください	迎えのベッドにはおのオムツを装着してきてください	酸素投与	カテーテル内血尿確認	カテーテル内血尿確認
				ドレーン確認	ドレーン確認	ドレーン確認
透析						
注射		OPF前ソルアセF500を1本80ml/HでルートキープしセファゾリンNa 1g+Na2ポート100mlをOPF室持ち込み。	OPF後ソルアセF500+カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg20mlを80ml/H、ソリタ-T3号6輸液 500mL、ソルアセF500ml投与。	OPF後ソルアセF500+カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg20mlを80ml/H、ソリタ-T3号6輸液 500mL、ソルアセF500ml投与。	食事5割食べていれば点滴終了後、可。＊食べていなければ主治医に確認をお願いします。	
			アセリオ1000mg×3（術後最終使用時間から6時間空けて使用してください。痛み予防投与のため痛みの有無にかかわらず継続投与。水分摂取は翌朝から再開が確認。	アセリオ1000mg×3（術後最終使用時間から6時間空けて使用してください。痛み予防投与のため痛みの有無にかかわらず継続投与。水分摂取は翌朝から再開が確認。		
食事		夕食は食べて良い。	禁飲食。			
安静度		フリー		ギャッチアップは痛みに応じ45度まで可。	9:00～安静度フリー。歩行不安定時は看護師付きそいで。リハビリ評価後からでも可能。	
清潔		シャワー浴可			本人希望あればシャワー浴可（ただしドレーンが無いことが条件）	希望あればシャワー浴可（ただしドレーンが無いことが条件）
指導	医師					
	看護	【リハビリ】背骨底筋体操パンフレット渡す	術後は坐薬・洗腸・換便も含めて、直腸操作は禁忌。内臓で便秘が解消しない場合は主治医に相談。またBaを固定したり、DIBキャップ付けたりしないこと。	術後は坐薬・洗腸は禁忌です。換便も含めて、直腸操作も禁忌	術後は坐薬・洗腸は禁忌です。換便も含めて、直腸操作も禁忌	術後は坐薬・洗腸は禁忌です。換便も含めて、直腸操作も禁忌
			血尿あっても基本的には止血剤は不要。スケール4以上で報告してください。			
	栄養指導					
服薬指導		内服全で続行。OPF当日の内服も続行だが抗血栓薬は確認してください。欠食時糖尿病薬SKIPしてください。糖尿病の人は血糖測定するかインスリンをスライ入院時セブノンド21内服	排便ないときはグリセリン液腸管通行（6:00）	内服再開	DM薬はOPF後二日目から再開。	
看護問題						
観察項目		血尿 残尿感 排尿時痛	血尿 残尿感 排尿時痛	血尿 残尿感 排尿時痛	血尿 残尿感 排尿時痛	血尿 残尿感 排尿時痛
			膀胱留置カテーテル挿入中 ドレーン排液性状	膀胱留置カテーテル挿入中 ドレーン排液性状	膀胱留置カテーテル挿入中 ドレーン排液性状	膀胱留置カテーテル挿入中 ドレーン排液性状
確認項目		手術同意書 術前同意書 DVT同意書 入院診療計画書 輸血同意書 輸血オーダーの確認	輸血（T&S）OPF中に投与する可能性あり			
リハビリ			RI依頼。			
退院調整						
カルテ						

条件付き指示		発熱時	発熱時	発熱時	発熱時	発熱時	発熱時
		疼痛時	疼痛時	疼痛時	疼痛時	疼痛時	疼痛時
		不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時
		不穏時	不穏時	不穏時	不穏時	不穏時	不穏時
		便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時
		嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時
		輸液	輸液	輸液	輸液	輸液	輸液
		押水	押水	押水	押水	押水	押水
		血尿時	血尿時	血尿時	血尿時	血尿時	血尿時
		カルチコール・GI療法	カルチコール・GI	カルチコール・GI	カルチコール・GI	カルチコール・GI	カルチコール・GI
		GI持続	GI持続	GI持続	GI持続	GI持続	GI持続
		ニカルジピンIV	ニカルジピンIV	ニカルジピンIV	ニカルジピンIV	ニカルジピンIV	ニカルジピンIV
		ニカルジピン持続	ニカルジピン持続	ニカルジピン持続	ニカルジピン持続	ニカルジピン持続	ニカルジピン持続
		フロセミドIV	フロセミドIV	フロセミドIV	フロセミドIV	フロセミドIV	フロセミドIV
		フロセミド持続	フロセミド持続	フロセミド持続	フロセミド持続	フロセミド持続	フロセミド持続
		デクスメデトミジン	デクスメデトミジ	デクスメデトミジ	デクスメデトミジ	デクスメデトミジ	デクスメデトミジ
		ノルアド・ビトレン	ノルアド・ビトレ	ノルアド・ビトレ	ノルアド・ビトレ	ノルアド・ビトレ	ノルアド・ビトレ
		痙攣・鎮静	痙攣・鎮静	痙攣・鎮静	痙攣・鎮静	痙攣・鎮静	痙攣・鎮静
		一般採血	一般採血	一般採血	一般採血	一般採血	一般採血
		血液ガス	血液ガス	血液ガス	血液ガス	血液ガス	血液ガス
		胸部レントゲン	胸部レントゲン	胸部レントゲン	胸部レントゲン	胸部レントゲン	胸部レントゲン
		胸部ポータブル	胸部ポータブル	胸部ポータブル	胸部ポータブル	胸部ポータブル	胸部ポータブル
		腹部レントゲン	腹部レントゲン	腹部レントゲン	腹部レントゲン	腹部レントゲン	腹部レントゲン
		腹部ポータブル	腹部ポータブル	腹部ポータブル	腹部ポータブル	腹部ポータブル	腹部ポータブル
		血培2セット	血培2セット	血培2セット	血培2セット	血培2セット	血培2セット
		尿培	尿培	尿培	尿培	尿培	尿培
		高血糖時 インスリン	高血糖時 インス	高血糖時 インス	高血糖時 インス	高血糖時 インス	高血糖時 インス
		低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示
		プロベト	プロベト	プロベト	プロベト	プロベト	プロベト
		亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏
		ロキソプロフェンテープ	ロキソプロフェン	ロキソプロフェン	ロキソプロフェン	ロキソプロフェン	ロキソプロフェン
		尿道カテ	尿道カテ	尿道カテ	尿道カテ	尿道カテ	尿道カテ
		創処置	創処置	創処置	創処置	創処置	創処置
		酸素	酸素	酸素	酸素	酸素	酸素
		ドレーン	ドレーン	ドレーン	ドレーン	ドレーン	ドレーン

6日目 術後4日目	7日目 術後5日目	8日目 術後6日目	9日目 術後7日目	10日目 術後8日目	11日目 術後9日目
6日目	7日目	8日目	9日目	10日目	11日目
■血尿の増強がない	■血尿の増強がない	■血尿の増強がない	■血尿の増強がない	■血尿の増強がない	
■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	
■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない	
■膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している	■膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している	■膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している	■膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している	■失禁が少なくなり、排尿間隔を保つことができる	
■合併症なく過ごすことができる	■合併症なく過ごすことができる	■合併症なく過ごすことができる	■合併症なく過ごすことができる	■合併症なく過ごすことができる	
	■退院後の留意点が理解できる ・新規-評価基準	■退院後の留意点が理解できる ・新規-評価基準	■退院後の留意点が理解できる ・新規-評価基準	■退院後の留意点が理解できる ・新規-評価基準	
	■退院に対して不安がない ・新規-評価基準	■退院に対して不安がない ・新規-評価基準	■退院に対して不安がない ・新規-評価基準	■退院に対して不安がない ・新規-評価基準	
■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる
血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）
睡眠	睡眠	睡眠	睡眠	睡眠	睡眠
排尿障害	排尿障害	排尿障害	排尿障害	排尿障害	排尿障害
疼痛	疼痛	疼痛	疼痛	疼痛	疼痛
嘔気	嘔気	嘔気	嘔気	嘔気	嘔気
出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）	出血（創部）
⇒ セレコキシブ ⇒	⇒ セレコキシブ ⇒	⇒ セレコキシブ ⇒	⇒ セレコキシブ ⇒		
⇒ カロナール ⇒	⇒ カロナール ⇒	⇒ カロナール ⇒	⇒ カロナール ⇒		
⇒ 酸化剤毎食後。下痢あれば、適宜減量。カルピス ⇒	⇒ 酸化剤毎食後。下痢あれば、適宜減量。カルピス ⇒	⇒ 酸化剤毎食後。下痢あれば、適宜減量。カルピス ⇒	⇒ 酸化剤毎食後。下痢あれば、適宜減量。カルピス ⇒		
⇒ 尿・ドレーンは6時で締めて熱型表とカルピスに色と性状を記入してください。ドレーン様 ⇒	⇒ 尿・ドレーンは6時で締めて熱型表とカルピスに色と性状を記入してください。ドレーン様 ⇒	⇒ 尿・ドレーンは6時で締めて熱型表とカルピスに色と性状を記入してください。ドレーン様 ⇒	⇒ 尿・ドレーンは6時で締めて熱型表とカルピスに色と性状を記入してください。ドレーン様 ⇒		
⇒ カテーテル内血尿確認 ⇒	⇒ カテーテル内血尿確認 ⇒	⇒ カテーテル内血尿確認 ⇒	⇒ カテーテル内血尿確認 ⇒		
		⇒ パーミロール貼り替え ⇒			
⇒ 希望あればシャワー浴可（ただしドレッシングが無いことが条件） ⇒	⇒ 希望あればシャワー浴可（ただしドレッシングが無いことが条件） ⇒	⇒ 希望あればシャワー浴可（ただしドレッシングが無いことが条件） ⇒	⇒ 希望あればシャワー浴可（ただしドレッシングが無いことが条件） ⇒	⇒ 希望あればシャワー浴可（ただしドレッシングが無いことが条件） ⇒	⇒ 希望あればシャワー浴可（ただしドレッシングが無いことが条件） ⇒
		尿カ予後予定。先生が抜きます。抜去後翌日もしくは、翌々日に退院予定。尿漏れの説明して下さい。	退院予定。	退院予定。	退院予定。
術後は坐薬、洗腸は禁忌です。排便も含めて、直腸操作も禁忌	術後は坐薬、洗腸は禁忌です。排便も含めて、直腸操作も禁忌	術後は坐薬、洗腸は禁忌です。排便も含めて、直腸操作も禁忌	術後は坐薬、洗腸は禁忌です。排便も含めて、直腸操作も禁忌	術後は坐薬、洗腸は禁忌です。排便も含めて、直腸操作も禁忌	術後は坐薬、洗腸は禁忌です。排便も含めて、直腸操作も禁忌
		Ba抜去後の生活指導（指導していただければ排泄ケア委員に連絡を）		次回診・退院処方確認	次回診・退院処方確認
		【リハビリ】 骨盤底筋体操指導			
⇒ 血尿 残尿感 排尿時痛 ⇒	⇒ 血尿 残尿感 排尿時痛 ⇒	⇒ 血尿 残尿感 排尿時痛 ⇒	⇒ 血尿 残尿感 排尿時痛 ⇒	⇒ 血尿 残尿感 排尿時痛 ⇒	⇒ 血尿 残尿感 排尿時痛 ⇒
⇒ 膀胱留置カテーテル挿入中 ドレーン排液性状 ⇒	⇒ 膀胱留置カテーテル挿入中 ドレーン排液性状 ⇒	⇒ 膀胱留置カテーテル挿入中 ドレーン排液性状 ⇒	⇒ 膀胱留置カテーテル挿入中 ドレーン排液性状 ⇒	⇒ 膀胱留置カテーテル挿入中 ドレーン排液性状 ⇒	⇒ 膀胱留置カテーテル挿入中 ドレーン排液性状 ⇒

発熱時	発熱時	発熱時	発熱時	発熱時	発熱時
疼痛時	疼痛時	疼痛時	疼痛時	疼痛時	疼痛時
不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時	不眠時
不穏時	不穏時	不穏時	不穏時	不穏時	不穏時
便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時	便秘時
嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時	嘔気・嘔吐時
輸液	輸液	輸液	輸液	輸液	輸液
押水	押水	押水	押水	押水	押水
血尿時	血尿時	血尿時	血尿時	血尿時	血尿時
カルチコール・GI GI持続	カルチコール・GI GI持続	カルチコール・GI GI持続	カルチコール・GI GI持続	カルチコール・GI GI持続	カルチコール・GI GI持続
ニカルジピンIV	ニカルジピンIV	ニカルジピンIV	ニカルジピンIV	ニカルジピンIV	ニカルジピンIV
ニカルジピン持続	ニカルジピン持続	ニカルジピン持続	ニカルジピン持続	ニカルジピン持続	ニカルジピン持続
フロセミドIV	フロセミドIV	フロセミドIV	フロセミドIV	フロセミドIV	フロセミドIV
フロセミド持続	フロセミド持続	フロセミド持続	フロセミド持続	フロセミド持続	フロセミド持続
デクスメドミジ ノルアド・ビトレ	デクスメドミジ ノルアド・ビトレ	デクスメドミジ ノルアド・ビトレ	デクスメドミジ ノルアド・ビトレ	デクスメドミジ ノルアド・ビトレ	デクスメドミジ ノルアド・ビトレ
痙攣、鎮静	痙攣、鎮静	痙攣、鎮静	痙攣、鎮静	痙攣、鎮静	痙攣、鎮静
一般採血	一般採血	一般採血	一般採血	一般採血	一般採血
血液ガス	血液ガス	血液ガス	血液ガス	血液ガス	血液ガス
胸部レントゲン	胸部レントゲン	胸部レントゲン	胸部レントゲン	胸部レントゲン	胸部レントゲン
胸部ポータブル	胸部ポータブル	胸部ポータブル	胸部ポータブル	胸部ポータブル	胸部ポータブル
腹部レントゲン	腹部レントゲン	腹部レントゲン	腹部レントゲン	腹部レントゲン	腹部レントゲン
腹部ポータブル	腹部ポータブル	腹部ポータブル	腹部ポータブル	腹部ポータブル	腹部ポータブル
血培2セット	血培2セット	血培2セット	血培2セット	血培2セット	血培2セット
尿培	尿培	尿培	尿培	尿培	尿培
高血糖時 インス	高血糖時 インス	高血糖時 インス	高血糖時 インス	高血糖時 インス	高血糖時 インス
低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示	低血糖指示
フロベト	フロベト	フロベト	フロベト	フロベト	フロベト
亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏	亜鉛華軟膏
ロキソプロフェン	ロキソプロフェン	ロキソプロフェン	ロキソプロフェン	ロキソプロフェン	ロキソプロフェン
尿道カテ	尿道カテ	尿道カテ	尿道カテ	尿道カテ	尿道カテ
創処置	創処置	創処置	創処置	創処置	創処置
酸素	酸素	酸素	酸素	酸素	酸素
ドレーン	ドレーン	ドレーン	ドレーン	ドレーン	ドレーン