ステップ名称		手術前日	手術当日 午前中	手術当日 手術後	第1病日	第2病日	第3病日　退院
		1日目	2日目		3日目	4日目	5日目
合併症	自覚症状			■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	
生活動作	活動			■ADLの拡大に努める	■ADLの拡大に努める	■ADLの拡大に努める	
	排便・排尿			■膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している	■膀胱留置カテーテル抜去後排尿障害を起こさない	■膀胱留置カテーテル抜去後排尿障害を起こさない	■膀胱留置カテーテル抜去後排尿障害を起こさない
知識・理解	退院時						■退院が可能な状態であることを、本人・家族が理解している ・新規-評価基準
							■退院後の留意点が理解できる ・新規-評価基準
							■退院に対して不安がない ・新規-評価基準
	入院時	■入院環境に慣れ、手術の受け入れができる					
	検査中		■手術がスムーズに行われる				
	検査後			■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる	
	第n病日						■問題なく退院できる
観察項目		残尿感 排尿障害 血尿（血尿スケール） 尿量	排尿障害 残尿感 血尿（血尿スケール） 尿量	残尿感 血尿（血尿スケール） 疼痛（下腹部） 尿量	疼痛（下腹部） 血尿（血尿スケール） 尿量	疼痛（下腹部） 血尿（血尿スケール） 尿量	疼痛（下腹部） 血尿（血尿スケール） 尿量
検査結果							
食事		希望食または治療食 21時～絶飲食	朝食から禁食 飲水は7時まで取れます	4時間後から飲水可能	朝から食事　希望食または治療食	希望食	希望食
安静度		フリー	病棟内フリー OPE室へは独歩可	ベット上安静	フリー	フリー	フリー
排泄							
清潔		入浴 爪切り	更衣　環境整備	お迎えはオムツを乗せていく。	シャワー可		
検査			KUB（8：00）	手術中透視 結石分析	血算、生化学		
治療処置				モニター 尿破棄時こし器使用。排石確認。 カテーテル内血尿確認 酸素投与	モニター 弾性ストッキングoff 朝回診後Drに確認し看護師で膀胱留置カテーテル抜去後、尿 カテーテル内血尿確認	カテーテル内血尿確認	カテーテル内血尿確認
薬剤		常用薬継続 21時センナリド2T 必要時リスミー1錠	必要時常用薬服用 6時術前点滴開始 ①ソルアセトF500ml ②ソルアセトF500ｍｌ 手術室持参セファゾリン	持続点滴 ①ソルアセトD500ml （80ml/h） +カルバゾクロム100mg ②ソリターT3、500ml （80ml/h） ③ソルアセトD500ml （80ml/h）	朝～常用薬服用		
説明・指導		入院時オリエンテーション 入院診療計画書 麻酔、手術内容説明 手術伝票確認 手術必要物品説明 承諾書回収 蓄尿方法の説明 麻酔科医より説明（外来で説明がなかった時）	手術必要物品確認 ・手術着 ・レオムツ 麻酔承諾書回収確認	Ba留置中の注意点		服薬指導	退院時説明 退院証明書 退院時服薬指導 再来予約票 10時退院
観察		排尿障害 残尿感 血尿 尿量 睡眠	排尿障害 残尿感 血尿 尿量 睡眠	排尿障害 残尿感 血尿 尿量 睡眠	排尿障害 残尿感 血尿 尿量 睡眠	排尿障害 残尿感 血尿 尿量 睡眠	排尿障害 残尿感 血尿 尿量 睡眠
糖尿病							
書類							
手術							
リハビリ							
カルテ							
転倒・転落							
自己管理							
条件付き指示		発熱時 疼痛時 不眠時 不穏時 便秘時 嘔気・嘔吐時 輸液 押水 血尿時 カルチコール・GI療法 GI持続 ニカルジピンIV ニカルジピン持続 フロセミドIV フロセミド持続 デクスメデトミジン ノルアド・ピトレシン 痙攣、鎮静 一般採血 血液ガス 胸部レントゲン 胸部ポータブル 腹部レントゲン 腹部ポータブル 血培2セット 尿培 高血糖時　インスリン 低血糖指示 プロベト 亜鉛華軟膏 ロキソプロフェンテープ 尿道カテ 創処置 酸素 ドレーン	発熱時 疼痛時 不眠時 不穏時 便秘時 嘔気・嘔吐時 輸液 押水 血尿時 カルチコール・GI療法 GI持続 ニカルジピンIV ニカルジピン持続 フロセミドIV フロセミド持続 デクスメデトミジン ノルアド・ピトレシン 痙攣、鎮静 一般採血 血液ガス 胸部レントゲン 胸部ポータブル 腹部レントゲン 腹部ポータブル 血培2セット 尿培 高血糖時　インスリン 低血糖指示 プロベト 亜鉛華軟膏 ロキソプロフェンテープ 尿道カテ 創処置 酸素 ドレーン	発熱時 疼痛時 不眠時 不穏時 便秘時 嘔気・嘔吐時 輸液 押水 血尿時 カルチコール・GI療法 GI持続 ニカルジピンIV ニカルジピン持続 フロセミドIV フロセミド持続 デクスメデトミジン ノルアド・ピトレシン 痙攣、鎮静 一般採血 血液ガス 胸部レントゲン 胸部ポータブル 腹部レントゲン 腹部ポータブル 血培2セット 尿培 高血糖時　インスリン 低血糖指示 プロベト 亜鉛華軟膏 ロキソプロフェンテープ 尿道カテ 創処置 酸素 ドレーン	発熱時 疼痛時 不眠時 不穏時 便秘時 嘔気・嘔吐時 輸液 押水 血尿時 カルチコール・GI療法 GI持続 ニカルジピンIV ニカルジピン持続 フロセミドIV フロセミド持続 デクスメデトミジン ノルアド・ピトレシン 痙攣、鎮静 一般採血 血液ガス 胸部レントゲン 胸部ポータブル 腹部レントゲン 腹部ポータブル 血培2セット 尿培 高血糖時　インスリン 低血糖指示 プロベト 亜鉛華軟膏 ロキソプロフェンテープ 尿道カテ 創処置 酸素 ドレーン	発熱時 疼痛時 不眠時 不穏時 便秘時 嘔気・嘔吐時 輸液 押水 血尿時 カルチコール・GI療法 GI持続 ニカルジピンIV ニカルジピン持続 フロセミドIV フロセミド持続 デクスメデトミジン ノルアド・ピトレシン 痙攣、鎮静 一般採血 血液ガス 胸部レントゲン 胸部ポータブル 腹部レントゲン 腹部ポータブル 血培2セット 尿培 高血糖時　インスリン 低血糖指示 プロベト 亜鉛華軟膏 ロキソプロフェンテープ 尿道カテ 創処置 酸素 ドレーン	発熱時 疼痛時 不眠時 不穏時 便秘時 嘔気・嘔吐時 輸液 押水 血尿時 カルチコール・GI療法 GI持続 ニカルジピンIV ニカルジピン持続 フロセミドIV フロセミド持続 デクスメデトミジン ノルアド・ピトレシン 痙攣、鎮静 一般採血 血液ガス 胸部レントゲン 胸部ポータブル 腹部レントゲン 腹部ポータブル 血培2セット 尿培 高血糖時　インスリン 低血糖指示 プロベト 亜鉛華軟膏 ロキソプロフェンテープ 尿道カテ 創処置 酸素 ドレーン