

ステップ名称		前日	手術前	入院1日 手術後	術後1日目 退院日
		1日目	2日目		3日目
合併症	自覚症状			■血尿がない	
知識・理解	術前	■術前準備が整っている	■手術前の絶飲食が守れる		
		■手術の心構えができています	■術前準備が整っている		
			■手術の心構えができています		
			■予定通り手術を受けることができる		
	術後			■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる
	退院時				■退院が可能な状態であることを、本人・家族が理解している ・新規-評価基準
					■退院後の留意点が理解できる ・新規-評価基準
					■退院に対して不安がない ・新規-評価基準
	入院時		■入院環境に慣れ、検査の受け入れができる		
			■本人及び家族が治療計画を理解している ・新規-評価基準		
			■本人及び家族が手術・麻酔について理解している		
	第n病日				■問題なく退院できる
観察項目		血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	自尿	自尿
		残尿感	残尿感	排尿障害	排尿障害
		排尿障害	排尿障害	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）
		不安	便意	残尿感	残尿感
		尿量	不安	疼痛	疼痛
			尿量	尿量	尿量
検査結果					
食事			 当日の朝食事可 AM10時まで飲水のみ可 禁飲食	 食事、歩行は覚醒次第可能です	 常食または治療食
安静度			 病棟内フリー		 フリー
排泄			 OPE入室前に排尿	 ・排便確認（血便時はDrCall） ・腹満あれば導尿またはBa挿入 ・血尿スケール3以上の時はDrコール	 ・排便確認（血便時はDrCall） ・腹満あれば導尿またはBa挿入 ・血尿スケール3以上の時はDrコール
清潔					 シャワー可
検査			 外来検査結果確認	 検体提出確認	
治療処置			 オペ後ベッドにはフラットオムツ 1枚・酸素マスクを巻きます。		
薬剤		 内服全て続行。 OPE当日の内服も続行だが抗血栓薬は確認してください。糖尿病薬は欠食時SKIPしてください。糖尿病の人は血糖測定するのかインスリンをスライディングで投与	 ソルアセトF500 術前 ソルアセトF500 術後① ソルアセトF500 術後② セファゾリン1g 手術室持参 セファゾリン1g 術後（18時に投与） メインは翌朝までキープ。基本は翌日は点滴はない（Dr確認を）	 抗凝固・抗血小板薬以外は直ぐに再開OK。抗凝固薬、抗血栓薬はDr確認。	
説明・指導		 外来で手術オリエンテーション		 排便時無理な怒責をかけない	 排便時無理な怒責をかけない
		 入院計画書			 退院証明書
		 手術後安静の必要性を指導			 服薬指導
		 手術承諾書・麻酔同意書回収確認			 10時退院
		 手術後の必要物品の確認			 血尿、下血、発熱などの症状があったら病棟に相談してください
		 入院時オリエンテーション			
		 術中看護確認			
観察		 排尿障害 血尿 残尿感 排便 術前の不安 睡眠中	 排尿障害 血尿 残尿感 排便 術前の不安 睡眠中	 自尿 排尿障害 血尿 残尿感 血便 疼痛 睡眠中	 自尿 排尿障害 血尿 残尿感 血便 疼痛 睡眠中
				 KT38.5℃以上の発熱はDrコールしてください。	 KT38.5℃以上の発熱はDrコールしてください。
糖尿病					
書類					
手術					
リハビリ					
カルテ					

転倒・転落							
自己管理							
条件付き指示	発熱時	⇒	発熱時	⇒	発熱時	⇒	発熱時
	疼痛時	⇒	疼痛時	⇒	疼痛時	⇒	疼痛時
	不眠時	⇒	不眠時	⇒	不眠時	⇒	不眠時
	不穏時	⇒	不穏時	⇒	不穏時	⇒	不穏時
	便秘時	⇒	便秘時	⇒	便秘時	⇒	便秘時
	嘔気・嘔吐時	⇒	嘔気・嘔吐時	⇒	嘔気・嘔吐時	⇒	嘔気・嘔吐時
	輸液	⇒	輸液	⇒	輸液	⇒	輸液
	押水	⇒	押水	⇒	押水	⇒	押水
	血尿時	⇒	血尿時	⇒	血尿時	⇒	血尿時
	カルチコール・GI療法	⇒	カルチコール・GI療法	⇒	カルチコール・GI療法	⇒	カルチコール・GI療法
	GI持続	⇒	GI持続	⇒	GI持続	⇒	GI持続
	ニカルジピンIV	⇒	ニカルジピンIV	⇒	ニカルジピンIV	⇒	ニカルジピンIV
	ニカルジピン持続	⇒	ニカルジピン持続	⇒	ニカルジピン持続	⇒	ニカルジピン持続
	フロセミドIV	⇒	フロセミドIV	⇒	フロセミドIV	⇒	フロセミドIV
	フロセミド持続	⇒	フロセミド持続	⇒	フロセミド持続	⇒	フロセミド持続
	デクスメデトミジン	⇒	デクスメデトミジン	⇒	デクスメデトミジン	⇒	デクスメデトミジン
	ノルアド・ビトレシン	⇒	ノルアド・ビトレシン	⇒	ノルアド・ビトレシン	⇒	ノルアド・ビトレシン
	痙攣、鎮静	⇒	痙攣、鎮静	⇒	痙攣、鎮静	⇒	痙攣、鎮静
	一般採血	⇒	一般採血	⇒	一般採血	⇒	一般採血
	血液ガス	⇒	血液ガス	⇒	血液ガス	⇒	血液ガス
	胸部レントゲン	⇒	胸部レントゲン	⇒	胸部レントゲン	⇒	胸部レントゲン
	胸部ポータブル	⇒	胸部ポータブル	⇒	胸部ポータブル	⇒	胸部ポータブル
	腹部レントゲン	⇒	腹部レントゲン	⇒	腹部レントゲン	⇒	腹部レントゲン
	腹部ポータブル	⇒	腹部ポータブル	⇒	腹部ポータブル	⇒	腹部ポータブル
	血培2セット	⇒	血培2セット	⇒	血培2セット	⇒	血培2セット
	尿培	⇒	尿培	⇒	尿培	⇒	尿培
	高血糖時 インスリン	⇒	高血糖時 インスリン	⇒	高血糖時 インスリン	⇒	高血糖時 インスリン
	低血糖指示	⇒	低血糖指示	⇒	低血糖指示	⇒	低血糖指示
	プロベト	⇒	プロベト	⇒	プロベト	⇒	プロベト
	亜鉛華軟膏	⇒	亜鉛華軟膏	⇒	亜鉛華軟膏	⇒	亜鉛華軟膏
	ロキソプロフェンテープ	⇒	ロキソプロフェンテープ	⇒	ロキソプロフェンテープ	⇒	ロキソプロフェンテープ
	尿道カテ	⇒	尿道カテ	⇒	尿道カテ	⇒	尿道カテ
	創処置	⇒	創処置	⇒	創処置	⇒	創処置
	酸素	⇒	酸素	⇒	酸素	⇒	酸素
	ドレーン	⇒	ドレーン	⇒	ドレーン	⇒	ドレーン
					尿閉時 導尿またはバルーン挿入（入りにくければDr 依頼）		