

ステップ名称		手術前日（入院日）	手術当日 午前	手術当日 手術後	第1病日
		1日目	2日目		3日目
合併症	自覚症状	■血尿がない	■血尿がない	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる
				■血尿がない	■血尿がない
生活動作	活動			■ADLの拡大に努める	■ADLの拡大に努める
	排便・排尿			■膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している	■膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している
知識・理解	術前		■術前準備が整っている		
			■手術の心構えができています		
			■手術に対する不安を軽減できる		
	退院時				
	入院時	■入院環境に慣れ、手術の受け入れができる			
		■本人及び家族が治療計画を理解している・新規・評価基準			
		■本人及び家族が手術・麻酔について理解している			
	検査中		■手術がスムーズに行われる		
	検査後			■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる
	第n病日				
観察項目		排尿障害	排尿障害	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）
		血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	尿量	不穏状態
		残尿感	残尿感	疼痛（下腹部）	疼痛（下腹部）
		不安	不安	不穏状態	尿量
				睡眠	
検査結果					
食事		 21時～絶飲食	 絶飲食	 4時間後から飲水可能。 内服再開は確認。	 朝から希望食または治療食
安静度		 フリー	 病棟内フリー	 ベット上安静	 回診後病棟内フリー
排泄					
清潔		 入浴、爪切り	 オムツ着の中はオムツ装着。標準体格でも基本はLサイズ使用して下さい。小柄な場合はサイズ調整		 回診後、シャワー
		 更衣 環境整備	 更衣 環境整備	 更衣 環境整備	 更衣 環境整備
					 陰部洗浄
検査		 外来検査結果確認		 血算 生化学	 血算 生化学
治療処置				 承諾書回収確認	 回診時、外尿道口消毒
				 Ba牽引（必要時砂囊牽引する場合があるのでDr.へ確認お願いします）	 回診時、Ba牽引解除
				 弾性ストッキング	 弾性ストッキングoff
				 カテーテル内血尿確認	 カテーテル内血尿確認
				 酸素投与	
薬剤		 21時センナリド2T 必要時リスミー1T	 必要時常用薬服用 6時術前点滴開始 ①ソルアセトF500ml ②ソルアセトF500ml	 持続点滴 ①ソリタ-T3、500ml (80ml/h)+ カルバソクロム100mg ②ソルアセトD500ml (80ml/h)	 ソリタ-T3、500ml+カルバソクロム100mg (80ml/h) 終了抜針。
		 内服全て続行。 当日の内服も続行だが抗血栓薬・糖尿病薬は確認してください。糖尿病の人は血糖測定するのかインスリンをスライディングで投	 手術室持参 生食100ml+セファリンNa1g 1キット		

説明・指導		 麻酔、手術内容説明	 麻酔承諾書回収確認					
		 入院診療計画書	 承諾書回収確認					
		 入院時オリエンテーション	 手術必要物品確認					
		 手術必要物品説明						
		 術中看護確認						
		 承諾書回収確認						
		 ネームバンド						
		 排尿ケア依頼してください						
	観察		 排尿障害 血尿 残尿感 尿量 術前の不安 めまい ふらつき SpO2 入眠中 転倒、転落危険度	 排尿障害 血尿 残尿感 尿量 術前の不安 めまい ふらつき SpO2 入眠中 転倒、転落危険度	 下腹部痛 Ba挿入部痛 Ba閉塞 外尿道口部の出血 転倒転落危険度 血尿スケール 尿量 SpO2 不穏 入眠中	 下腹部痛 Ba挿入部痛 Ba閉塞 外尿道口部の出血 転倒転落危険度 血尿スケール 尿量 SpO2 不穏 入眠中		
糖尿病								
書類								
手術			 オペ後ベッドにフラットオムツ 1枚 酸素マスク を持って行っ て					
リハビリ								
カルテ								
転倒・転落								
自己管理								
条件付き指示		発熱時	⇒	発熱時	⇒	発熱時	⇒	発熱時
		疼痛時	⇒	疼痛時	⇒	疼痛時	⇒	疼痛時
		不眠時	⇒	不眠時	⇒	不眠時	⇒	不眠時
		不穏時	⇒	不穏時	⇒	不穏時	⇒	不穏時
		便秘時	⇒	便秘時	⇒	便秘時	⇒	便秘時
		嘔気・嘔吐時	⇒	嘔気・嘔吐時	⇒	嘔気・嘔吐時	⇒	嘔気・嘔吐時
		輸液	⇒	輸液	⇒	輸液	⇒	輸液
		押水	⇒	押水	⇒	押水	⇒	押水
		血尿時	⇒	血尿時	⇒	血尿時	⇒	血尿時
		カルチコール・GI療法	⇒	カルチコール・GI療法	⇒	カルチコール・GI療法	⇒	カルチコール・GI療法
		GI持続	⇒	GI持続	⇒	GI持続	⇒	GI持続
		ニカルジピンIV	⇒	ニカルジピンIV	⇒	ニカルジピンIV	⇒	ニカルジピンIV
		ニカルジピン持続	⇒	ニカルジピン持続	⇒	ニカルジピン持続	⇒	ニカルジピン持続
		フロセミドIV	⇒	フロセミドIV	⇒	フロセミドIV	⇒	フロセミドIV
		フロセミド持続	⇒	フロセミド持続	⇒	フロセミド持続	⇒	フロセミド持続
		デクスメドミジン	⇒	デクスメドミジン	⇒	デクスメドミジン	⇒	デクスメドミジン
		ノルアド・ビトレジン	⇒	ノルアド・ビトレジン	⇒	ノルアド・ビトレジン	⇒	ノルアド・ビトレジン
		痙攣、鎮静	⇒	痙攣、鎮静	⇒	痙攣、鎮静	⇒	痙攣、鎮静
		一般採血	⇒	一般採血	⇒	一般採血	⇒	一般採血
		血液ガス	⇒	血液ガス	⇒	血液ガス	⇒	血液ガス
		胸部レントゲン	⇒	胸部レントゲン	⇒	胸部レントゲン	⇒	胸部レントゲン
		胸部ポータブル	⇒	胸部ポータブル	⇒	胸部ポータブル	⇒	胸部ポータブル
		腹部レントゲン	⇒	腹部レントゲン	⇒	腹部レントゲン	⇒	腹部レントゲン
		腹部ポータブル	⇒	腹部ポータブル	⇒	腹部ポータブル	⇒	腹部ポータブル
		血培2セット	⇒	血培2セット	⇒	血培2セット	⇒	血培2セット
		尿培	⇒	尿培	⇒	尿培	⇒	尿培
		高血糖時 インスリン	⇒	高血糖時 インスリン	⇒	高血糖時 インスリン	⇒	高血糖時 インスリン
		低血糖指示	⇒	低血糖指示	⇒	低血糖指示	⇒	低血糖指示
		プロベト	⇒	プロベト	⇒	プロベト	⇒	プロベト
		亜鉛華軟膏	⇒	亜鉛華軟膏	⇒	亜鉛華軟膏	⇒	亜鉛華軟膏
		ロキソプロフェンテープ	⇒	ロキソプロフェンテープ	⇒	ロキソプロフェンテープ	⇒	ロキソプロフェンテープ
		尿道カテ	⇒	尿道カテ	⇒	尿道カテ	⇒	尿道カテ
		創処置	⇒	創処置	⇒	創処置	⇒	創処置
		酸素	⇒	酸素	⇒	酸素	⇒	酸素
		ドレーン	⇒	ドレーン	⇒	ドレーン	⇒	ドレーン

第2病日	第3病日	第4病日	第5病日
4日目	5日目	6日目	7日目
■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる
■血尿がない	■血尿がない		
■ADLの拡大に努める	■ADLの拡大に努める	■ADLの拡大に努める	■ADLの拡大に努める
■膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している	■膀胱留置カテーテルの管理方法を理解している	■膀胱留置カテーテル抜去後排尿障害を起こさない	■膀胱留置カテーテル抜去後排尿障害を起こさない
■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる	■異常の早期発見と対処ができる
血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）	血尿（血尿スケール）
不穏状態	不穏状態	残尿感	残尿感
疼痛（下腹部）	疼痛（下腹部）	尿量	不穏状態
尿量	尿量	不穏状態	尿量
希望食または治療食	希望食または治療食	希望食または治療食	希望食または治療食
フリー	フリー	フリー	フリー
回診後、シャワー	シャワー	シャワー	シャワー
更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備	更衣 環境整備
陰部洗浄	陰部洗浄	陰部洗浄	陰部洗浄
		外来で尿流量、残尿測定	
		回診時、膀胱留置カテーテル抜去	
カテーテル内血尿確認	カテーテル内血尿確認	カテーテル内血尿確認	

			 退院指導
 下腹部痛 Ba挿入部痛 Ba閉塞 外尿道口部の出血 転倒転落危険度 血尿スケール 尿量 SP02 不穏 睡眠	 下腹部痛 Ba挿入部痛 Ba閉塞 外尿道口部の出血 転倒転落危険度 血尿スケール 尿量 SP02 不穏 睡眠	 排尿 血尿スケール 排尿時痛 残尿感 尿漏れ 尿量 SP02 不穏 転倒転落危険度 睡眠	 排尿 血尿スケール 排尿時痛 残尿感 尿漏れ 尿量 SP02 不穏 転倒転落危険度 睡眠
⇒ 発熱時	⇒ 発熱時	⇒ 発熱時	⇒ 発熱時
⇒ 疼痛時	⇒ 疼痛時	⇒ 疼痛時	⇒ 疼痛時
⇒ 不眠時	⇒ 不眠時	⇒ 不眠時	⇒ 不眠時
⇒ 不穏時	⇒ 不穏時	⇒ 不穏時	⇒ 不穏時
⇒ 便秘時	⇒ 便秘時	⇒ 便秘時	⇒ 便秘時
⇒ 嘔気・嘔吐時	⇒ 嘔気・嘔吐時	⇒ 嘔気・嘔吐時	⇒ 嘔気・嘔吐時
⇒ 輸液	⇒ 輸液	⇒ 輸液	⇒ 輸液
⇒ 押水	⇒ 押水	⇒ 押水	⇒ 押水
⇒ 血尿時	⇒ 血尿時	⇒ 血尿時	⇒ 血尿時
⇒ カルチコール・GI療法	⇒ カルチコール・GI療法	⇒ カルチコール・GI療法	⇒ カルチコール・GI療法
⇒ GI持続	⇒ GI持続	⇒ GI持続	⇒ GI持続
⇒ ニカルジピンIV	⇒ ニカルジピンIV	⇒ ニカルジピンIV	⇒ ニカルジピンIV
⇒ ニカルジピン持続	⇒ ニカルジピン持続	⇒ ニカルジピン持続	⇒ ニカルジピン持続
⇒ フロセミドIV	⇒ フロセミドIV	⇒ フロセミドIV	⇒ フロセミドIV
⇒ フロセミド持続	⇒ フロセミド持続	⇒ フロセミド持続	⇒ フロセミド持続
⇒ デクスメデトミジン	⇒ デクスメデトミジン	⇒ デクスメデトミジン	⇒ デクスメデトミジン
⇒ ノルアド・ビトレシン	⇒ ノルアド・ビトレシン	⇒ ノルアド・ビトレシン	⇒ ノルアド・ビトレシン
⇒ 痙攣・鎮静	⇒ 痙攣・鎮静	⇒ 痙攣・鎮静	⇒ 痙攣・鎮静
⇒ 一般採血	⇒ 一般採血	⇒ 一般採血	⇒ 一般採血
⇒ 血液ガス	⇒ 血液ガス	⇒ 血液ガス	⇒ 血液ガス
⇒ 胸部レントゲン	⇒ 胸部レントゲン	⇒ 胸部レントゲン	⇒ 胸部レントゲン
⇒ 胸部ポータブル	⇒ 胸部ポータブル	⇒ 胸部ポータブル	⇒ 胸部ポータブル
⇒ 腹部レントゲン	⇒ 腹部レントゲン	⇒ 腹部レントゲン	⇒ 腹部レントゲン
⇒ 腹部ポータブル	⇒ 腹部ポータブル	⇒ 腹部ポータブル	⇒ 腹部ポータブル
⇒ 血培2セット	⇒ 血培2セット	⇒ 血培2セット	⇒ 血培2セット
⇒ 尿培	⇒ 尿培	⇒ 尿培	⇒ 尿培
⇒ 高血糖時 インスリン	⇒ 高血糖時 インスリン	⇒ 高血糖時 インスリン	⇒ 高血糖時 インスリン
⇒ 低血糖指示	⇒ 低血糖指示	⇒ 低血糖指示	⇒ 低血糖指示
⇒ プロベト	⇒ プロベト	⇒ プロベト	⇒ プロベト
⇒ 亜鉛華軟膏	⇒ 亜鉛華軟膏	⇒ 亜鉛華軟膏	⇒ 亜鉛華軟膏
⇒ ロキソプロフェンテープ	⇒ ロキソプロフェンテープ	⇒ ロキソプロフェンテープ	⇒ ロキソプロフェンテープ
⇒ 尿道カテ	⇒ 尿道カテ	⇒ 尿道カテ	⇒ 尿道カテ
⇒ 創処置	⇒ 創処置	⇒ 創処置	⇒ 創処置
⇒ 酸素	⇒ 酸素	⇒ 酸素	⇒ 酸素
⇒ ドレーン	⇒ ドレーン	⇒ ドレーン	⇒ ドレーン

[illegible]

	退院時説明
	退院時服薬指導
	再来予約票
	10時退院
	排尿 血尿スケール 排尿時痛 残尿感 尿漏れ 尿量 SpO2 不穩 転倒転落危険度 睡眠
	発熱時
	疼痛時
	不眠時
	不穩時
	便秘時
	嘔気・嘔吐時
	輸液
	押水
	血尿時
	カルチコール・GI療法
	GI持続
	ニカルジピンIV
	ニカルジピン持続
	フロセミドIV
	フロセミド持続
	デクスメトミジン
	ノルアド・ビトレジン
	痙攣、鎮静
	一般採血
	血液ガス
	胸部レントゲン
	胸部ポータブル
	腹部レントゲン
	腹部ポータブル
	血培2セット
	尿培
	高血糖時 インスリン
	低血糖指示
	プロベト
	亜鉛華軟膏
	ロキソプロフェンテープ
	尿道カテ
	創処置
	酸素
	ドレーン