

ステップ名称		入院日	手術当日		術後1日目	術後2日目	術後3日目（退院日）
		1日目	2日目		3日目	4日目	5日目
患者状態	症状		手術当日（手術前） ■創傷コントロールができています		手術当日（手術後） ■創傷コントロールができています	■創傷コントロールができています	■創傷コントロールができています
	バイタル				■37.5℃以上の発熱がない・<37.5℃	■37.5℃以上の発熱がない・<37.5℃	■37.5℃以上の発熱がない・<37.5℃
生活動作	活動		■術後の安静が守れる		■早期離床ができる	■ADLの拡大に努める	■ADLの拡大に努める
	経口				■ADLの拡大に努める		
知識・理解	術前	■術前準備が整っている	■手術前の絶飲食が守れる				
		■手術の心構えができています	■手術の心構えができています				
		■手術に対する不安を軽減できる	■予定通り手術を受けることができます				
			■手術に対する不安を軽減できる				
	術後		■手術したことを受け入れている		■合併症なく過ごすことができます		
			■創部感染を起こさない		■異常の早期発見と対処ができる		
			■異常の早期発見と対処ができる				
	退院時						■退院に対して不安がない
第n病日							■問題なく退院できる
観察項目		疼痛 不安	疼痛 不安	出血	疼痛 不安 出血	疼痛 不安 出血	疼痛 不安 出血
検査結果							
検査	内視鏡						
	血液検査				血液検査		
	放射線			レントゲン			
	生理検査						
	血管造影						
処方		眼剤、下剤内服					
処置	看護						
	透析						
注射			術前点滴	術後点滴		朝食半量摂取で抜針	
食事		夕食後より絶食 飲水可	朝より絶食		朝から飲水・食事開始		
安静度		病棟内歩行可	病棟内歩行可	ベッド上安静	トイレ洗面可	フリー	フリー
清潔						洗髪	
指導	医師	持参薬確認 抗凝固薬中止確認		術後血圧指示	持参薬再開確認	退院前診察	
				術後血圧指示			
	看護	入院時オリエンテーション	術衣着用	フットポンプ装着	朝Ba抜去	次回外来予約の確認	
		リストバンド装着	弾性ストッキング着用	必要時、電気毛布使用	看護師見守りにて初回歩行実施	退院時処方の確認	
		身長・体重測定		飲水開始は排ガス後から（少量の水で湿らす程度であれば腸蠕動音聴取後許可）	朝から飲水・食事開始	退院後の留意点指導	
		入院時バイタル測定					
		術前オリエンテーション					
		剃毛（恥骨まで）、シャワー浴					
		腹帯なし					
		膀胱置（オリブオイル）					
	栄養指導						
	服薬指導						
看護問題							
観察項目							
確認項目							
リハビリ							
退院調整							
カルテ							
条件付き指示		発熱時	発熱時	発熱時	発熱時	血圧上昇時	発熱時
		疼痛時	血圧上昇時	血圧上昇時	血圧上昇時	発熱時	血圧上昇時
		嘔気時	疼痛時	疼痛時	疼痛時	疼痛時	疼痛時
		尿量減少時	嘔気時	嘔気時	嘔気時	嘔気時	嘔気時
		不眠時	尿量減少時	尿量減少時	尿量減少時	不眠時	不眠時
		不眠時	不眠時	不眠時	不眠時		