

ステップ名称		入院日	前日	手術当日	手術当日 手術後
		1日目	2日目	3日目	
				手術前	手術後
合併症	自覚症状				■苦痛・創部痛のコントロールができる
	客観的観察				■創部の出血がない
生活動作	活動				■術後の安静が守れる
	経口				
知識・理解	術前		■手術前の絶飲食が守れる	■手術前の絶飲食が守れる	
			■術前の処置について理解している	■術前の処置について理解している	
			■術前呼吸訓練について理解している	■術前準備が整っている	
			■不安の内容を表出できる	■手術の心構えができています	
			■手術に対する不安を軽減できる	■不安の内容を表出できる	
			■下剤を内服することができる	■手術に対する不安を軽減できる	
	術後				■手術したことを受け入れている
					■創部感染を起こさない
	退院時				
	入院時	■入院環境に慣れ、手術の受け入れができる			
		■入院について理解している ・新規-評価基準			
		■本人及び家族が手術・麻酔について理解している			
		検査中			■手術がスムーズに行われる
	検査後				■異常の早期発見と対処ができる
	第n病日				
観察項目		腹部不快感	腹部不快感	腹部不快感	疼痛（創部）
		排便障害	排便障害	排便障害	ドレーン排液量
		便性状	便性状	排ガス	ドレーン排液量（経鼻胃管）
		排ガス	排ガス	便性状	排ガス
		腸蠕動音	腸蠕動音	腸蠕動音	腸蠕動音
		食事摂取量（主食/副食）	食事摂取量（主食/副食）	不安	
		不安	不安		
検査結果					
食事			 夕から欠食、飲水可 夕食後より手術当日7時 までにアルジネット ウォーター2本摂取	 朝から絶食 当日7時までにアルジ ネットウォーター2本摂 取	 欠食
安静度		 フリー	 病棟内フリー	 ベッド上	
排泄				 尿道カテーテル挿入中	
清潔		 環境整備・寝衣交換	 環境整備・寝衣交換	 環境整備・寝衣交換	
		 入院後シャワー入浴			
検査				 術後オペ室レントゲン （胸腹部ポータブル）	

治療処置					
					酸素マスク5L 朝回診まで
薬剤		 タからカナマイシン 250mg・フラジール 250mg開始。タ・眠前。	 カナマイシン250mg8錠 フラジール250mg4錠 毎食後と眠前	 必要な持参薬は朝のみ 内服	 《末梢》100ml/hr ①ソルアセトD500ml ②YDソリタ-T3 500ml ③YDソリタ-T3 500ml 21時 セフメタバック 100ml
		 必要な持参薬継続 抗凝固剤服用中でない か確認を徹底！	 9時からニフレック	 《末梢》 6:00開始、100ml/hr ①ソルアセトF500ml ②ソルアセトF500ml	
			 補液開始	 朝6時GE60ml	
説明・指導		 入院時オリエンテー ション			
		 OPオリエンテーション 施行 T字体1枚 弾圧サイズ 測定のみ 腹帯1枚は名前書き。 1枚はリット共に保管			
		 必要物品確認（入院診 療計画書・手術同意 書・麻酔同意書・輸血 同意書・抑制同意書）			
		 地域連携がんパス説明			
		 手術説明、家族来院時 間の確認			
観察			 腹部症状の有無 排便の有無 血便の有無 排ガス、腸蠕動音の有 無 食事摂取量 入院、手術に関する不 安の有無	 腹部症状の有無 排便の有無 血便の有無 排ガス、腸蠕動音の有 無 食事摂取量 入院、手術に関する不 安の有無	 腹部症状の有無 排便の有無 血便の有無 排ガス、腸蠕動音の有 無 食事摂取量 入院、手術に関する不 安の有無
			 睡眠	 睡眠	 睡眠
			 腹部症状の有無 排便の有無 血便の有無 排ガス、腸蠕動音の有 無 入院、手術に関する不 安の有無	 腹部症状の有無 排便の有無 血便の有無 排ガス、腸蠕動音の有 無 入院、手術に関する不 安の有無	 麻酔覚醒 創痛 創部浸出液の有無 ドレーン排液 胃管排液 呼吸器合併症の有無 排ガスの有無 腸蠕動音の有無
糖尿病					
書類					
手術					
リハビリ		 リハビリ開始			
カルテ					
転倒・転落					
自己管理					
条件付き指示		 対照指示（内服）	 対照指示（内服）	 対照指示（内服）	
		 対症指示（点滴）	 対症指示（点滴）	 対症指示（点滴）	

手術後 1日目	手術後 2日目	手術後 3日目	手術後 4日目	手術後 5日目
4日目	5日目	6日目	7日目	8日目
■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる
■ドレーンからの出血がない	■ドレーンからの出血がない	■ドレーン抜去部からの出血がない		
		■ドレーンから空気漏れがない		
■早期離床ができる	■ADLの拡大に努める	■ADLの拡大に努める	■ADLの拡大に努める	■ADLの拡大に努める
■水分摂取ができる	■水分摂取ができる	■食事摂取ができる	■食事摂取ができる	
■ドレーンの必要性について理解している	■疼痛・苦痛、気分不良を訴えることができる	■創部感染を起こさない	■創部感染を起こさない	■創部感染を起こさない
■手術したことを受け入れている	■ドレーンの必要性について理解している	■ドレーンを安全に持ち歩くことができる	■転倒リスクを理解でき、安全に歩行できる	■転倒リスクを理解でき、安全に歩行できる
■転倒リスクを理解でき、安全に歩行できる	■ドレーンを安全に持ち歩くことができる	■転倒リスクを理解でき、安全に歩行できる		
■創部感染を起こさない	■創部感染を起こさない			
	■手術したことを受け入れている			
	■転倒リスクを理解でき、安全に歩行できる			
			■退院が可能な状態であることを、本人・家族が理解している ・新規-評価基準	■退院が可能な状態であることを、本人・家族が理解している ・新規-評価基準
			■退院後の留意点が理解できる ・新規-評価基準	■退院後の留意点が理解できる ・新規-評価基準
			■退院に対して不安がない ・新規-評価基準	■退院に対して不安がない ・新規-評価基準
			■退院後、本人・家族が創の状態を観察できる	■退院後、本人・家族が創の状態を観察できる
				■問題なく退院できる
疼痛（創部）	疼痛（創部）	疼痛（創部）	疼痛（創部）	疼痛（創部）
ドレーン排液性状	ドレーン排液色調	自尿	浸出液	排ガス
ドレーン排液量	ドレーン排液性状	腸蠕動音	排ガス	腸蠕動音
ドレーン排液性状（経鼻胃管）	ドレーン排液量	ドレーン排液色調	腸蠕動音	浸出液
ドレーン排液量（経鼻胃管）	ドレーン排液色調（経鼻胃管）	ドレーン排液性状	排便障害	食事摂取量（主食/副食）
排ガス	ドレーン排液性状（経鼻胃管）	ドレーン排液量		排便障害
腸蠕動音	ドレーン排液量（経鼻胃管）	排ガス		不安
	排ガス	排便障害		
	腸蠕動音	便性状		
 回診後より水分free	 GFO	 易消化食5分粥	 易消化食全粥	 易消化食米飯
			 栄養指導	
 離床開始	 離床開始	 病棟内フリー	 病棟内フリー	 病棟内フリー
 尿道カテーテル挿入中	 尿道カテーテル挿入中			
 環境整備・寝衣交換	 環境整備・寝衣交換	 環境整備・寝衣交換	 環境整備・寝衣交換	 環境整備・寝衣交換
 清拭	 清拭	 清拭	 清拭	 清拭
 血液検査		 血液検査		
 胸部・腹部レントゲン 回診前までに（ポータブル）		 胸部・腹部レントゲン （朝一番。回診前まで）		

	創部包交		創部包交		創部包交		創部包交		創部包交
	モニターoff				ドレーン抜去				
	酸素中止								
	呼吸苦あればカヌラ2L								
	フットポンプ中止								
	常用薬再開（降圧剤・ 眠剤・抗精神病薬など）		《末梢》 ①ソルアセトD500ml ②YDソリタ-T3 500ml 食事摂れれば終了抜針		《末梢》 ①ソルアセトD500ml ②YDソリタ-T3 500ml 食事摂れれば終了抜針		《末梢》 ①ソルアセトD500ml ②YDソリタ-T3 500ml 食事摂れれば終了抜針		《末梢》 ①ソルアセトD500ml ②YDソリタ-T3 500ml 食事摂れれば終了抜針
	《末梢》 ①ソルアセトD500ml ②YDソリタ-T3 500ml ③YDソリタ-T3 500ml セフメタバック1回目 セフメタバック2回目				①ソルアセトD		常用薬再開（糖尿病、 高脂血症など食事に関する薬剤の再開）		常用薬再開（抗凝固剤 など周術期禁止薬剤の再開）
	離床指導		離床指導		家族に栄養指導の日に ち時間を連絡。都合が悪ければ調 バイタルサイン4件（6 時間後毎）		パンフレットを用いて指導		薬剤師から服薬指導
	バイタルサイン6件（4 時間毎）		バイタルサイン6件（4 時間後毎）		バイタルサイン4件（6 時間後毎）		バイタルサイン4件（6 時間後毎）		バイタルサイン3件（8 時間後毎）
	腹部症状の有無 排便の有無 血便の有無 排ガス、腸蠕動音の有無 食事摂取量 入院、手術に関する不安の有無		腹部症状の有無 排便の有無 血便の有無 排ガス、腸蠕動音の有無 食事摂取量 入院、手術に関する不安の有無		腹部症状の有無 排便の有無 血便の有無 排ガス、腸蠕動音の有無 食事摂取量 入院、手術に関する不安の有無		腹部症状の有無 排便の有無 血便の有無 排ガス、腸蠕動音の有無 食事摂取量 入院、手術に関する不安の有無		腹部症状の有無 排便の有無 血便の有無 排ガス、腸蠕動音の有無 食事摂取量 入院、手術に関する不安の有無
	睡眠		睡眠		睡眠		睡眠		睡眠
	麻酔覚醒 創痛 創部浸出液の有無 ドレーン排液 胃管排液 呼吸器合併症の有無 排ガスの有無 腸蠕動音の有無		麻酔覚醒 創痛 創部浸出液の有無 ドレーン排液 胃管排液 呼吸器合併症の有無 排ガスの有無 腸蠕動音の有無		麻酔覚醒 創痛 創部浸出液の有無 ドレーン排液 胃管排液 呼吸器合併症の有無 排ガスの有無 腸蠕動音の有無		麻酔覚醒 創痛 創部浸出液の有無 ドレーン排液 胃管排液 呼吸器合併症の有無 排ガスの有無 腸蠕動音の有無		麻酔覚醒 創痛 創部浸出液の有無 ドレーン排液 胃管排液 呼吸器合併症の有無 排ガスの有無 腸蠕動音の有無
	麻酔覚醒 創痛 創部浸出液の有無 ドレーン排液 胃管排液 呼吸器合併症の有無 排ガスの有無 腸蠕動音の有無		創痛 創部浸出液の有無 ドレーン排液 胃管排液 呼吸器合併症の有無 排ガスの有無 腸蠕動音の有無		創痛 創部浸出液の有無 ドレーン排液 呼吸器合併症の有無 排ガスの有無 腸蠕動音の有無 自尿 排便の有無 血便の有無		創痛 創部浸出液の有無 呼吸器合併症の有無 排ガスの有無 腸蠕動音の有無 排便の有無		創痛 創部浸出液の有無 呼吸器合併症の有無 排ガスの有無 腸蠕動音の有無 排便の有無 食事摂取量
									退院計画
	術後リハビリ								
	対照指示（内服）		対照指示（内服）		対照指示（内服）		対照指示（内服）		対照指示（内服）
	対症指示（点滴）		対症指示（点滴）		対症指示（点滴）		対症指示（点滴）		対症指示（点滴）