

ステップ名称		手術前日	手術当日 手術前	手術当日 手術後	術後1日目	術後2日目	術後3日目	術後4日目	術後5日目
		1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	
合併症	自覚症状	■胃痛・胸部痛のコントロールができる	■胃痛・胸部痛のコントロールができる	■胃痛・胸部痛のコントロールができる	■胃痛・胸部痛のコントロールができる	■胃痛・胸部痛のコントロールができる	■胃痛・胸部痛のコントロールができる	■胃痛・胸部痛のコントロールができる	■胃痛・胸部痛のコントロールができる
	客観的観察	■前部の出血がない	■前部の出血がない	■前部の出血がない	■前部の出血がない	■前部の出血がない	■前部の出血がない	■前部の出血がない	■前部の出血がない
		■前部の発赤・腫脹がない	■前部の発赤・腫脹がない	■前部の発赤・腫脹がない	■前部の発赤・腫脹がない	■前部の発赤・腫脹がない	■前部の発赤・腫脹がない	■前部の発赤・腫脹がない	■前部の発赤・腫脹がない
		■術後神経障害がない	■術後神経障害がない	■術後神経障害がない	■術後神経障害がない	■術後神経障害がない	■術後神経障害がない	■術後神経障害がない	■術後神経障害がない
生活動作	活動	■シャワー浴ができる							
	経口	■水分摂取が問題なくできる							
知識・理解	術前		■手術前の絶飲食が守れる						
	検査前日		■手術の準備ができる						
	入院時	■本人及び家族が治療計画を理解している							
		■術後・退院基準							
観察項目	疼痛	疼痛	疼痛	疼痛	疼痛	疼痛	疼痛	疼痛	疼痛
	可動性（足趾）	可動性（足趾）	可動性（足趾）	可動性（足趾）	可動性（足趾）	可動性（足趾）	可動性（足趾）	可動性（足趾）	可動性（足趾）
	熱感	熱感	熱感	熱感	熱感	熱感	熱感	熱感	熱感
	腫脹	腫脹	腫脹	腫脹	腫脹	腫脹	腫脹	腫脹	腫脹
	動脈血圧（左足背動脈）	動脈血圧（左足背動脈）	動脈血圧（左足背動脈）	動脈血圧（左足背動脈）	動脈血圧（左足背動脈）	動脈血圧（左足背動脈）	動脈血圧（左足背動脈）	動脈血圧（左足背動脈）	動脈血圧（左足背動脈）
	動脈血圧（右足背動脈）	動脈血圧（右足背動脈）	動脈血圧（右足背動脈）	動脈血圧（右足背動脈）	動脈血圧（右足背動脈）	動脈血圧（右足背動脈）	動脈血圧（右足背動脈）	動脈血圧（右足背動脈）	動脈血圧（右足背動脈）
	呼吸	呼吸	呼吸	呼吸	呼吸	呼吸	呼吸	呼吸	呼吸
検査結果									
食事		21時以降絶食	7時以降絶食	絶食	食事再開				
安静度				ベッド上安静 下肢挙上＋ カテーテル	安静度50確保				
清潔		シャワー浴	清拭後、手術室に更衣		清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア	清潔ケア
検査		骨代謝マーカー		OPC検査	一般検査（Hb、Pを含む） ADL（リンパ） P-選択の測定 問題なければ翌日に心電図検査（24時間） 全身骨密度検査	骨密度検査			
危機対応	点滴トラブル確保								
	強性ストッキング装着								
	5a留置								
薬剤			鎮痛剤のみ内服（24時間） 出来なそう OPC点滴（医師、心不全のある患者）	骨髄痛薬内服 鎮痛剤の増量（持参薬を参照）	内服全て再開	OPC後点滴	OPC後点滴	OPC後点滴	一般検査、骨代謝マーカー、BMD検査、骨密度検査
					鎮痛薬開始	鎮痛薬開始	鎮痛薬開始	鎮痛薬開始	鎮痛薬開始
					OPC後点滴				
									抗凝固薬内服へ移行
説明・指導		術前説明（カンファレンス）			緊急対応 生活指導				
					栄養指導 問題点の抽出 食事摂取 栄養指導 MSEの実施				
観察		患肢観察	患肢観察	患肢観察	患肢観察	発熱・創部 発赤・疼痛 増悪あれば バイオシグナル	発熱・創部 発赤・疼痛 増悪あれば バイオシグナル	発熱・創部 発赤・疼痛 増悪あれば バイオシグナル	FRAX評価 （ワードパス） レット参
		50歳以上にMSE測定			発熱・創部 発赤・疼痛 増悪あれば、すぐに バイオシグナル				発熱・創部 発赤・疼痛 増悪あれば、すぐに バイオシグナル
感染症									
書類		手術同意書の確認			転倒リスク評価 （点検）				
手術									
リハビリ		リハビリオーダー 転倒リスク			転倒リスク				
カルテ		患科受診歴の有無 カルテ記載			転倒リスク カルテ記載 評価の実施 （点検）				
転倒・転落									
自己管理									
条件付き指示									

[illegible]