

ステップ名称		手術前日	手術当日 手術前	手術当日 手術後	術後1日目				
		1日目	2日目		3日目				
合併症	自覚症状			■苦痛・創部痛のコントロールができる	■苦痛・創部痛のコントロールができる				
	客観的観察			■創部の出血がない	■創部の出血がない				
				■創部の発赤・腫脹がない	■創部の発赤・腫脹がない				
				■術後神経障害がない	■術後神経障害がない				
知識・理解	術前	■手術に対する準備ができる	■手術前の絶飲食が守れる						
			■術前準備が整っている						
	検査前日	■手術の準備ができる							
	入院時	■絶飲食について理解している							
観察項目		疼痛	疼痛	疼痛（創部）	疼痛（創部）				
		腫脹	緊張	神経障害	神経障害				
		しびれ	腫脹	疼痛	疼痛				
		熱感	しびれ	腫脹	腫脹				
		不安	熱感	しびれ	可動性（足趾）				
		睡眠	不安	出血（創部）	しびれ				
			睡眠	浸出液	出血（創部）				
				腫脹（創周囲）	浸出液				
				睡眠	動脈触知（左足背動脈）				
				心電図モニター波形	睡眠				
				熱感	動脈触知（右足背動脈）				
				呼吸困難感	熱感				
					腫脹（創周囲）				
					心電図モニター波形				
			呼吸困難感						
検査結果									
食事		常食（21時以降絶食）		7時以降絶飲食		術後3時間後より飲水可、術後6時間後より食事可		常食（患者の状態によっては変更可）	
安静度		フリー				術後3時間より、疼痛に応じてフリー		創部の状態次第で退院可能	
排泄		フリー				術後3時間までは床上排泄。		痛みに応じてトイレ可	
清潔		シャワー浴		清拭後、手術着に更衣					
検査								術後採血	
治療処置			p _i イブプロフェン測定 ネーパ [®] ント [®] 装着 点滴ルート確保		p _i イブプロフェン測定		p _i イブプロフェン測定		p _i イブプロフェン測定 朝に心電図モニターoff
			日常生活 ⁷	→	日常生活 ⁷	→	日常生活 ⁷	→	日常生活 ⁷
							全身麻酔セット		全身麻酔セット
薬剤			持参薬鑑別 全続行（手術日当日を除く） 手術日当日は、抗凝固薬、糖尿病薬、血管新生阻害作用を有する薬、サプリメントは中止、他は続行		OPE点滴				術後点滴、鎮痛薬、抗生剤
説明・指導		入院オリエンテーション 術前オリエンテーション							
観察		患部観察	→	患部観察	→	患部観察	→	患部観察	
						創部観察	→	創部観察	
糖尿病									
書類			入院申し込み書、保険外給付サービス利用同意書の説明						
			入院診療計画書の記入と受け取り						
			入院診療計画書 手術承諾書 麻酔同意書 肺塞栓予防の同意書						
			保険外給付サービス利用申し込みの確認・提出						
			問診票の記入・入力						
手術									
リハビリ									
カルテ									
転倒・転落									
自己管理		お薬手帳と持参薬の受け取りと鑑別							
条件付き指示									