神経膠腫レジメン

レジメン名	薬剤名	投与量	投与日	投与経路	投与時間	1コース
TMZ(初回導入・注射)	テモゾロミド	75mg/㎡	day1～42	点滴静注	90分	70日間
TMZ+BEV(初回導入・注射)	ベバシズマブ	10mg/kg	day1、15、29、42	点滴静注	90分	70日間
	テモゾロミド	75mg/㎡	day1～42	点滴静注	90分	
TMZ+BEV(初回導入)	ベバシズマブ	10mg/kg	day1、15、29、42	点滴静注	90分	70日間
	テモゾロミド	75mg/㎡	day1～42	経口	分1	
TMZ+BEV(150mg/㎡)	ベバシズマブ	10mg/kg	day1、15	点滴静注	90分	28日間
	テモゾロミド	150mg/㎡	day1～5	経口	分1	
TMZ+BEV(200mg/㎡)	ベバシズマブ	10mg/kg	day1、15	点滴静注	90分	28日間
	テモゾロミド	200mg/㎡	day1～5	経口	分1	
TMZ(200mg/㎡・注射)	テモゾロミド	200mg/㎡	day1、2、3、4、5	点滴静注	90分	28日間
TMZ+BEV(150mg/㎡・注射)	ベバシズマブ	10mg/kg	day1、15	点滴静注	90分	28日間
	テモゾロミド	150mg/㎡	day1、2、3、4、5	点滴静注	90分	
BEV単独	ベバシズマブ	10mg/kg	day1	点滴静注	90分	14日間
High dose MTX	メトトレキサート	3500mg/㎡	day1	点滴静注	3時間	14日間